

d'enregistrement
au C.N.R.S.
A.O. 4954

THÈSES

PRÉSENTÉES

A LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

POUR OBTENIR

LE GRADE DE DOCTEUR ÈS-SCIENCES PHYSIQUES

PAR

M. Ivan MENTRÉ

PREMIÈRE THÈSE

*" Tautomérie zwitterionique des acides amino benzoïques et
naphthoïques "*

DEUXIÈME THÈSE

Propositions données par la Faculté

Soutenues le 20-XI-1970 devant la Commission d'examen

M. SOUCHAY

Président

M. SCHAAL

M. TRÉMILLON

M. NORMANT

} Examineurs

N° d'enregistrement
au C.N.R.S.
A.O. 4954

THÈSES

PRÉSENTÉES

A LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

POUR OBTENIR

LE GRADE DE DOCTEUR ÈS-SCIENCES PHYSIQUES

PAR

M. Ivan MENTRÉ

PREMIÈRE THÈSE

*" Tautomérie zwitterionique des acides amino benzoïques et
naphtoïques "*

DEUXIÈME THÈSE

Propositions données par la Faculté

Soutenues le 20-XI-1970 devant la Commission d'examen

M. SOUCHAY

Président

M. SCHAAL

M. TRÉMILLON

M. NORMANT

} Examineurs

THESIS

A LA FACULTE DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITE DE PARIS

ES GRAD DE DOCTEUR EN SCIENCES MATHÉMATIQUES

M. L. L. L. L.





Digitized by the Internet Archive
in 2026 *A ma Femme*

https://archive.org/details/IA41551508_0002

Je remercie Messieurs les Professeurs SOUCHAY , TREMILLON , NORMANT d'avoir bien voulu juger ce mémoire et de m'avoir fait part de leurs suggestions .

Je tiens à témoigner toute ma gratitude à Monsieur le Professeur SCHAAI , qui m'a permis de réaliser la majeure partie de cette étude dans son laboratoire et pour l'attention qu'il a toujours accordée à mon travail .

Je veux lui associer dans ma reconnaissance Monsieur GABORIAUD , Docteur-es-Sciences , pour l'aide qu'il m'a prodiguée dans la mise au point de mes connaissances sur les solvants mixtes , et pour toutes les discussions enrichissantes que nous avons eues .

Je remercie Monsieur le Professeur SIGWALT pour l'aide matérielle qu'il m'a accordée , en me confiant un poste dans son service d'enseignement .

Les produits étudiés ici ont été préparés en grande partie au laboratoire de Chimie Analytique de l'Institut National Supérieur de Chimie Industrielle de Rouen . C'est là , également , que les spectres infra-rouge ont été tracés . Je tiens à remercier Messieurs CAULLET et PETITCOLAS pour les conseils qu'ils m'ont donnés .

Les installations "basse température" ont été mises à ma disposition par Monsieur DOUZOU du service de Biospectroscopie de l'Institut de Biologie Physico-Chimique ; Monsieur HUI BON HOA m'a donné de précieux conseils pour l'utilisation de ces techniques . Qu'ils veuillent bien accepter mes remerciements pour leur aide précieuse .

J'ai toujours trouvé dans les laboratoires de recherche et d'application de la FMC SA. encouragements et aide matérielle . Que Monsieur KOPP , Directeur de l'usine d'Oissel , et Messieurs ROE et THIROT , du laboratoire de recherche , trouvent ici un témoignage de ma reconnaissance .

Certains des produits utilisés m'ont été fournis gracieusement par des entreprises chimiques . Je remercie tout particulièrement les sociétés :

- BAYER A.G. Leverkusen - Bayerwerk
- SANDOZ Bâle
- CASSELLA A.G. Frankfurt - Fechenheim
- CIBA Bâle

pour l'aide qu'elles m'ont ainsi accordée .

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	1
A - ETUDE INFRA-ROUGE.....	5
I - Attribution des fréquences	9
II - Distinction entre formes tautomères.....	16
I° PARTIE	
B - DEFINITIONS.....	20
I - Définitions.....	20
II - Modification des équilibres.....	22
III- Solvants mixtes.....	31
C - DETERMINATION DES CONSTANTES.....	33
I - Construction des échelles p^{SH}	33
II-- Titrages potentiométriques.....	38
III- Titrages spectrophotométriques.....	44
D - RESULTATS EXPERIMENTAUX.....	50
I - Acides non substitués.....	50
II - Comparaison des méthodes.....	52
III- Détermination des constantes de dissociation.....	64
II° PARTIE	
E - METHODES D'APPROXIMATION.....	66
I - Réaction A.....	67
II - Réaction B.....	68
III- Réaction C.....	73
IV - Réaction D.....	74
V - Déplacement de l'équilibre de tautomérisation Z.....	82
F - COMPARAISON DES RESULTATS.....	85
I - Comparaison des résultats.....	85
II - Critique des méthodes.....	89
III- Obtention des constantes vraies.....	90
G - MODIFICATIONS DE L'EQUILIBRE DE TAUTOMERIE Z.....	94
I - Effets de force ionique.....	94
II - Effet de solvant.....	95
III- Effet de température.....	101
IV - Conclusion.....	115

III° PARTIE


H -	RELATIONS D'ENTHALPIE LIBRE	117
I -	Relations d'enthalpie libre.....	117
II -	Acides de type AH	118
III -	Acides de type BH^+	121
IV -	Conclusion.....	124
I -	ETUDE DE LA SOLVATATION.....	126
I -	Relations entre structure et réactivité.....	126
II -	Effets de solvant sur les acides étudiés.....	128
III -	Discussion.....	131
IV -	Conclusion.....	134
	CONCLUSION.....	139

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

INTRODUCTION

Dans la famille des amino acides , de formule générale (I) , on examine souvent séparément les "acides aminés" , a cause de leur présence significative dans les composés biologiques .



T = groupement organique

Si les problèmes posés par la structure des composés ont été abondamment étudiés pour les "acides aminés" , il n'en est pas de même pour les autres amino-acides , et en particulier pour ceux qui appartiennent à la série aromatique .

D'une manière générale , dès que coexistent , sur la même molécule , deux centres réactifs -l'un acide -AH , l'autre basique -B - on peut envisager l'échange d'un proton entre ces deux groupes , ce qui conduit à l'existence possible de deux formes tautomères M et Z :



molécule

M

et



zwitterion

Z (1,2,48,49)

Cette étude ne s'est attachée qu'à un seul problème de structure: celui de l'équilibre entre la molécule M et le zwitterion Z .

Les produits que nous étudions peuvent se trouver , dans les conditions ordinaires , sous deux états :

- état solide (produit pur)

- solution (produit solvaté)

Les propriétés physiques , chimiques ou biologiques sont , le plus souvent, déterminées et utilisées en solution . La basicité de B et l'acidité de AH dépendent du milieu où se trouve placé le produit . C'est pourquoi la détermination de la structure des amino acides , liée aux acidités de -BH⁺ ou -AH , dans ces conditions ; représente le problème le plus important .

La nécessité d'une telle étude s'est fait sentir, puis-que plusieurs auteurs signalent l'importance de cet équi-libre de tautomérie

- a) dans la détermination de constantes d'acidité (1 à 6- -10-40 à 43-35)
- b) dans l'interprétation des résultats expérimentaux à l'aide des relations linéaires d'enthalpie libre ("L.F.E.R.") (12 à 15-35)

D'autres travaux admettent implicitement que la structure est parfaitement déterminée dans les conditions expérimen-tales choisies (16 et 17), ou même ne tiennent pas compte de cette éventualité dans l'interprétation des résultats (18). Cette omission peut alors amener à formuler des conclu-sions hâtives.


Plusieurs approches sont possibles et l'équilibre entre M et Z a été estimé pour des produits variés

- à partir de déterminations expérimentales :
 - . constante diélectrique (19-20-52-53-54)
 - . conductivité (21)
 - . solubilité (23-24)
 - . volume molaire apparent (25 à 28)
 - . grandeurs thermodynamiques (22-29)
 - . analyse de spectres U.V. (30-36-42-44-45)
 - . analyse des spectres de fluorescence (36)
 - . analyse de spectres I.R. (31 à 34)
 - . constantes d'ionisation (1-2-6-10-23-29-40 à 44-46-50-95)
- par le calcul sur la base des L.F.E.R. (11-15-35)

Quelle que soit la méthode employée, l'équilibre entre M et Z est toujours étudié par référence aux formes ioni-sées I^+ et I^- .



Ces quatre corps sont en équilibre suivant le schéma II



en faisant
abstraction des
ions H^+ échangés

(11)

Les équilibres acide-base dépendent :

- . du système transmetteur T entre AH et B
- . du solvant
- . de la température
- . de la force ionique

Nous avons limité notre étude :

1°) à deux systèmes aromatiques T :

- . le benzène, en raison du nombre considérable de travaux théoriques qui concernent les effets de transmission électronique dans ce noyau ;
- . le naphthalène, afin d'apporter des mesures nouvelles, et d'étudier plus complètement le comportement de ce système.

Les corps étudiés —dont les préparations sont données en Annexe II— sont les acides :

amino -2,-3,-4 benzoïques
amino -3,-4,-5,-6,-8 naphtoïques -1
amino -1,-3,-4 naphtoïques -2

2°) à l'étude des pKa dans l'eau et les mélanges eau-méthanol.

Les déterminations effectuées dans l'eau sont nombreuses pour les acides amino-benzoïques (annexe V) ; mais il n'en existe qu'une seule (6) pour deux acides amino-naphtoïques.

En raison de la faible solubilité de ces acides en milieu aqueux, les quelques travaux partiels qui les concernent ont été effectués dans des mélanges eau-alcool. Le plus souvent les auteurs se sont placés dans un seul milieu (12 et 16) : eau-éthanol à 50% en volume.

Les travaux décrivant l'utilisation de plusieurs mélanges, pour ces déterminations, sont rares, et ne concernent que des acides amino-benzoïques (41)

Le méthanol, utilisé par Bright et Briscoe (41) pour cette étude, présente l'avantage, par rapport aux autres alcools, d'avoir une masse moléculaire, et une structure moins éloignées de celles

de l'eau. Son pouvoir solvant est suffisant pour permettre l'étude de ces dérivés, en solutions assez concentrées. D'autre part, des expériences préliminaires ont montré que dans tous les cas étudiés l'emploi de méthanol en proportions croissantes, allant éventuellement jusqu'à l'alcool pur, est suffisant pour faire régresser complètement l'équilibre de tautométrie entre M et Z.

Enfin, les caractéristiques principales de ces mélanges ont été largement étudiées (75-76-78)

3°) à des milieux de force ionique faible ($\mu = 10^{-2}M$)

Dans ces conditions, les lois relatives aux solutions diluées sont applicables, et nous en avons déduit les pK_a thermodynamiques à $\mu = 0$, en utilisant les résultats déjà obtenus par de LIGNY (75-76) ;

4°) à une température de mesure égale à 20°C.

Pour des raisons de commodité expérimentale, propres au laboratoire, les constantes d'ionisation ont été déterminées à $\theta = + 20^\circ C$.

Toutefois, une étude de plusieurs produits en milieux mixtes variés, a été faite sur une large gamme de température — que permettent les mélanges d'eau et de méthanol — de $+ 55^\circ$ à $- 110^\circ C$.

Les mesures effectuées nous ont permis de connaître les valeurs de K_Z et des quatre constantes K_A à K_D .

Ces déterminations de K_Z conduisent à préciser la structure des différents produits dans les mélanges eau-méthanol à différentes températures, et à étudier l'équilibre de tautométrie, pour un certain nombre d'isomères dans des conditions variées.

Nous avons, d'autre part, examiné les résultats, en fonction des diverses tentatives de traitement quantitatif entreprises pour le benzène et le naphthalène, dans le cadre des relations linéaires d'enthalpie libre (L.E.F.R.)

C H A P I T R E A

page

ETUDE INFRA-ROUGE

5

I- ATTRIBUTION DES FREQUENCES PROPRES A CHAQUE VIBRATEUR

9

1°) Vibrations propres au squelette

9

2°) Vibrations propres au groupe COOH

11

3°) Absorptions propres au groupe COO⁻

12

4°) Absorptions propres au groupe NH₃⁺

12

5°) Absorptions propres au groupe NH₂

13

6°) Etude de la substitution

14

II- DISTINCTION ENTRE FORMES TAUTOMERES

16

CHAPITRE A : INFRA-ROUGE

L'étude infra-rouge des molécules, soit en solution, soit à l'état solide, présente l'avantage de fournir des renseignements directs sur la structure des différents groupes, sur leur environnement, et la nature des liaisons qu'ils établissent avec le reste de la molécule.

Les études d'acides aminés en I.R. sont extrêmement nombreuses ; La deutération de la fonction ~~carboxylique~~ ou du groupement $-NH_2$ permet, le plus souvent, d'attribuer les fréquences de résonance propres aux différents vibrateurs.

Cette méthode a permis de montrer que les acides aminobenzène et naphthalène sulfoniques existent à l'état essentiellement zwitterionique à l'état solide (501 à 504)

Une technique analogue a déjà été utilisée pour déterminer la structure d'acides amino-benzotiques, (505 à 511), soit à l'état solide, soit en solution.

Dans cette étude, un examen préalable des spectres I.R. des acides amino-benzotiques et naphtoïques, a montré qu'il existe deux types de composés, dont la figure ① donne un exemple.

- | | |
|-----------|---|
| - type I | Les vibrations N-H attribuables au groupe $-NH_2$ apparaissent entre 3 000 et 4 000 cm^{-1} |
| - type II | Les bandes d'absorption de $-NH_2$ n'apparaissent pas dans cette région |



Pourtant, dans chacun de ces deux types, les mêmes bandes existent dans le spectre de l'ion carboxylate, et ont disparu dans celui de l'ion amonium correspondant à l'acide (Figure ②).

Il est logique de penser séparer ainsi, qualitativement, les composés pour lesquels la forme zwitterionique est prépondérante à l'état solide, de ceux pour lesquels la forme moléculaire l'emporte.

Comparaison des deux types de spectres


TYPE I

TYPE II



Afin de présenter une étude aussi complète que possible de cette question, nous avons réalisé les spectres des acides amino-benzoïques et naphthoïques disponibles (voir annexe II : préparations), de leurs sels alcalins (K^+ ou Na^+), de leur chlorhydrate, ou de leur sulfate. Certains amino-acides se sont trouvés être instables en milieu acide, et leurs chlorhydrates n'ont pu être préparés à un degré de pureté suffisant pour l'analyse I.R.

Nous avons adopté le processus suivant pour dépouiller systématiquement les spectres :



Les spectres I.R. des acides benzoïques et naphthoïques, figurant dans cette étude, ont été réalisés pour des échantillons à l'état solide, en dispersion dans le bromure de potassium (voir conditions opératoires annexe I).

I - ATTRIBUTION DES FREQUENCES PROPRES A CHAQUE VIBRATEUR :

Le dépouillement complet des spectres et les attributions ont déjà été discutés par ailleurs (512) et (513), et nous ne donnerons ici que les résultats susceptibles d'éclairer l'étude de la tautomérie entre M et Z.

Nous avons distingué six types fondamentaux de vibreurs

- le squelette benzénique ou naphthalénique
 - COOH
 - COO⁻
- les groupes
 - NH₂
 - NH₃⁺
- les systèmes -C-H dont les vibrations sont liées au mode de substitution du squelette.

1 - Vibrations propres au squelette

Les vibrations propres aux structures benzéniques et naphthaléniques ont fait l'objet de nombreux travaux (502-511 à 529-512-513) dont les principaux nous ont permis de suivre les variations des absorptions relatives aux produits étudiés.

Les types de vibration, les fréquences, et les attributions pour le naphthalène sont tirés de Luther et Drewitz (530), Claverie-Garrigou-Lagrange (531) et Claverie (532).

En accord avec ces travaux, nous avons identifié un certain nombre de suites dont la fréquence varie peu, les fréquences correspondantes ont été attribuées aux vibrations de squelette. Tableaux AI et II.

Tableau AI
(Benzène)

déformation	groupe C-H					groupe C-C	$\nu_{cm^{-1}}$
dans le plan	2900-3200					1450-1525	1525-1625
	un, deux ou trois pics						
hors du plan	750	750	675	800	800	650-700	
					875		
substitution	mono	1,2	1,3	1,4	1,2,4		

(Naphthalène)

Tableau A-II

suite	domaine de variations PRESENT TRAVAIL cm ⁻¹	ref. (530) cm ⁻¹	ref. (539) cm ⁻¹	mode (530-531)	attributions
1	2910 - 3080	3050	3030	ω 6 B 1g	VALENCE V C-H combinaison
2	1925 1995	1950	1950	ω 10 B 2u	
3	1620 1695	1622	1672	ω 1 A g	déformation C-C
4	1590 1610	1596	1592	ω 15 B 3u	dans le plan
5	1565 1575	1580	1566	ω 2 A g	
6	1495 1510	1509	1506	ω 7 B 1g	
7	1450 1485	1460		ω 11 B 2u	
8	1425 1450	1432		ω 14 B 3u	
9	1370 1410	1389	1389	δ ₆ B 2u	déformation δ C-H
10	1355 1360	1360	1366	δ ₄ B 1g	
11	1250 1310	1266	1271	δ ₃ B 1g	
12	1200 1220	1239	1211	δ ₄ A g	
13	1160 1175	1169	1142	incertain	
14	1135 1155	1145	1122	δ ₂ A g	
15	1080 1110	1126		δ ₈ B 3u	
16	1005 1040	1025	1008	incertain	déformation γ C-H
17	1000 1015	1008		incertain	déformation
18	975 990	980		γ ₈ B 3g	déformation C-H
19	945 965	9944	959	ω 12 B 2u	dans le plan
20	880 915	944			
21	610 670	618	616		
22	580 615	591		ω B 1g	

Les suites variables en position, observées par (531) et (532) n'ont pas été suivies ici, car elles ont été attribuées par ces auteurs à des couplages dont la nature n'est pas certaine, et leur étude n'entraîne pas dans le cadre du problème que nous voulions essayer de résoudre.

Les substituants fixés sur la molécule perturbent peu les vibrations propres au squelette. Ils peuvent être identifiés grâce aux fréquences caractéristiques de chaque groupe, après élimination des absorptions dues à la structure, dont les domaines de variation viennent d'être précisés.

2°- Absorptions propres au groupe-COOH (502-533-534)

Le massif caractérisant les liaisons complexes des acides carboxyliques apparaît nettement entre 2 000 et 3 000 cm^{-1} . On peut le diviser en deux bandes (notées A et B sur la figure 1). Cette absorption est due à la vibration de valence ν -OH (535 à 537). La bande B est décrite par Bratoz (537) comme un satellite de la bande A, et serait due au couplage de deux vibrations -COOH de plus basses fréquences (1420 et 1300 cm^{-1}).

Les absorptions caractéristiques du groupe -COOH ont été localisées et comparées à quelques résultats publiés par divers auteurs.

Tableau A-III

suite	domaine de variation cm^{-1}	ref. (538) cm^{-1}	ref. (505) cm^{-1}	ref. (508) cm^{-1}	ref. (539) cm^{-1}	attributions
C 1	3030-3110			3000	3380-3450	ν -OH monomère
C 2 (A)	2815-3030				2900	ν -OH dimère + combinaisons
C 3 (B)	2500-2665			2500	2500	
C 4	1655-1700	1665-1747	1690	1670	1650-1704	ν C=O dimère
C 5	1405-1465	1395-1435	1422		1350	combinaison ν_{CO} et δ_{OH}
C 6	1240-1295		1290			δ -OH et ν C-O
C 7	1240-1295	1183-1297				combinaison ν_{CO} et δ_{OH}
					1150	COMBINAISON
C 8	885 - 965		910	980		β -OH
						vibrations hors du plan (dimère)
C 9	750 - 785	765 - 935		760	770 -820	hors du plan ω -OH

On peut remarquer sur ce tableau que C 4 est assez sensible à l'influence des substituants .

3°- Absorptions propres au groupe -COO^-

Ces attributions sont un peu plus délicates, car les absorptions sont très fréquemment couplées, et apparaissent souvent dans des zones où les vibrations dues au squelette sont très nombreuses.

Tableau AIV

groupe	suite	domaine cm^{-1}	attributions	littérature cm^{-1}		
				(538)	(505)	(508)
COO^-	D ₁	1530 - 1635	ν C-O asym.	1570-1630	1560	1565-1980
	D ₂	1365 - 1410	ν C-O sym.	1420-1390	1380	1360-1370
	D ₃	660 - 695	δ COO^-		660-670	

4°- Absorptions propres au groupe -NH_3^+

Là encore, les fréquences correspondant aux absorptions du groupe -NH_3^+ apparaissent dans les mêmes domaines que les absorptions de squelette, les attributions sont souvent assez délicates.

Tableau AV

groupe	suite	domaine cm^{-1}	attributions	littérature cm^{-1}		
				(505)	(538)	(539)
-NH_3^+	E ₁	2900-3000	(*) ν NH_3^+ asym.	3000-3100		
	E ₂	2800-2900 2600		2900-3000		2600
	E ₃	1560-1640	δ NH_3^+ asym.	1640-1660	1573-1660	1640
	E ₄	1510-1560	δ NH_3^+ sym.	1515-1511	1445-1544	1530
	E ₅	1320-1390	ν C - N			1306-1358
	E ₆	1100-1260	ρ r NH_3^+	1210-1220	1060-1260	1100-1150

(*) La forme de la bande d'absorption entre 2900 et 3000 cm^{-1} a été expliquée par un défaut d'équivalence des atomes d'hydrogène fixés sur l'azote (540 à 542) on a donc une absorption complexe au lieu des deux bandes distinctes, attribuables aux vibrations asymétriques et symétriques.

L'absorption centrée vers 2600 cm^{-1} peut être attribuée, comme dans le cas des groupes -COOH , à une résonance de Fermi entre plusieurs modes de déformation (δ et ρ) et les vibrations de valence -NH- . La fréquence est alors nettement abaissée et l'intensité de l'absorption croît.

5°- Absorptions propres au groupe -NH_2

Le vibreur -NH_2 a fait l'objet d'un nombre de travaux considérable. Les principaux qui intéressent notre étude (502-533-534-543) ont été repris par (528-529-512)

Les absorptions dues au groupe amino ont été notées A (tableau VI). A_1 et A_2 correspondent aux vibrations de valence $\nu\text{-N-H}$. A_1 est la vibration asymétrique, A_2 la vibration symétrique. Les intensités des pics A_1 et A_2 de la fonction amine primaire, qui apparaissent dans les spectres des sels d'acides amino-benzotiques et naphthotiques sont, en général, plus faibles que ceux qui apparaissent pour les acides correspondants - lorsque ceux-ci sont du type I.

Certains spectres présentent 3 pics au lieu des 2 attendus ; ce phénomène est attribué généralement à des associations détruisant la symétrie du groupe -NH_2 (534-533).

Ces fréquences vérifient avec une assez bonne précision la relation donnée par Bellamy (502):

$$\nu A_2 = 345,53 + 0,876 \nu A_1$$

ou celle de Krueger et Thomson (544):

$$\nu A_2 = 1023 + 0,682 \nu A_1$$

Tableau A. VI

suite	attribution	PRESENT TRAVAIL cm^{-1}	ref. (502) cm^{-1}	ref. (528) cm^{-1}	ref. (513) cm^{-1}
A 1	asym.	3380-3460	3450 3500	3390-3425	3420
A 2	$\nu\text{-NH}$ sym.	3310-3360	3300	3280-3360	3310
A 3		3210-3240		3300	
A 4	$\delta\text{-NH}$	1615-1630	1590-1650	1610-1640	1620
A 5	$\nu\text{-CN}$	1330-1365	1250-1340	1340-1360	1290
A 6		1280-1380		1215-1250	1380
A 7	$\rho\text{-NH}_2$	intensités		1100-1150	
A 8	$\omega\text{-NH}_2$	faibles		750 - 850	

6°- Etude de la substitution

Il est souvent fait mention de corrélations établies entre la fréquence de certaines bandes d'absorption et le mode de substitution du noyau naphthalénique ; comme pour les dérivés du benzène, les bandes d'absorption attribuées aux vibrations hors du plan des atomes d'hydrogène (bending γ C-H) sont reliées au nombre d'atomes pouvant vibrer. Suivant le type de substitution, on peut attribuer 4 bandes d'absorption :

- une bande correspondant à 4 atomes d'hydrogène adjacents couplés que nous noterons P4
- une bande correspondant à 3 atomes d'hydrogène adjacents couplés notée P3
- une bande correspondant à 2 atomes d'hydrogène adjacents couplés notée P2
- une bande correspondant à l'atome d'hydrogène isolé vibrant seul que nous noterons P1.

Ces bandes sont attribuées dans la zone $700-900\text{ cm}^{-1}$ et des domaines caractéristiques plus restreints ont été proposés par de nombreux auteurs.

Tableau A- VII

REF.	Année	Auteurs	P1 cm^{-1}	P2 cm^{-1}	P3 cm^{-1}	P4
502		BELLAMY	860-900	800-860	750-810	735-770
(546)	1957	HAWKINS-WARD	843-896	799-847	776-820	726-774
(547)	1963	CLAVERIE etc...	841-852	807-837	788-802	737-776
(528)	1966	Rapport INSCIR 1966	845-906	800-850	750-816	720-770
(512)	1967	J. MENTRE	870-890	810-835	770-810	735-775
(529)	1967	J.C. PAYAN	875-910	820-845	800	710-755

Une autre approche tente de définir des suites d'absorption caractéristiques, en se référant aux diverses positions de substitution possible.

Cette présentation permet, pour chaque type de substitution, de définir les bandes d'absorption avec plus de précision.





	Ref.	P4 cm^{-1}	P3 cm^{-1}	P2 cm^{-1}	P1 cm^{-1}
	(532) (531) (547) (548) (546)	- 764-787 764-776 762-778 730-774	- 788-814 788-802 788-807 776-820	(1)	(1)
	(531) (547) (532) (548) (546)	- 738-744 731-757 735-759 -	- (1)	- 807-837 793-837 812-833 805-847	- 841-852 836-908 - 846-894
	(531) (547) (532) (548) (546) Présent travail	- 737-746 737-783 743-770 722-753 730-780	- (1)	- 807-813 793-830 802-839 799-835 799-830	(1)
	(531) (547) (532) (548) (546) Présent travail	- - - 743-766 - 735-770	(1)	(1)	- - - 850-874 812-834 855-905

Tableau VIII

(1) cette absorption n'existe pas

Les spectres disponibles de dérivés mono et disubstitués ont été examinés dans le but de mettre en évidence la loi commandant les déplacements des fréquences, en fonction de la nature des substituants.


Nous avons déjà obtenu un premier résultat, concernant les fréquences ν_{P1} des dérivés monosubstitués du naphthalène (549-550). Nous avons montré que ν_{P1} peut être reliée à l'influence électronique du substituant, par une relation de type Hammett :

$$\nu_{P1} = 855,5 + 24\sigma_P \pm 3 \text{ cm}^{-1}$$

ou encore :

$$\nu_{P1} = 850,3 + 3,39 (\sigma_X^H - 1,55 \Delta\sigma_{1X} - 0,24 \Delta\sigma_{2X}) \quad \text{voir partie III C.R.P. H. L.F.E.R.}$$

Contrairement à ce qu'annonçait BELLAMY (502-551), une relation semblable ne peut être obtenue facilement, dans le cas des absorptions complexes P_2 , P_3 , P_4 , car il faut tenir compte des phénomènes de couplage. Le fait que plusieurs atomes d'hydrogène vibrent ensemble, et non pas chacun à une fréquence propre, nous amène à penser que, si la corrélation existe, elle est de nature complexe, et résulte de la superposition de plusieurs transmissions des effets électroniques.



Les termes de cette combinaison ne sont pas, pour l'instant, connus, et leur appréciation semble extrêmement délicate.

Une étude visant à préciser ce point, dans le but d'établir une nouvelle relation entre structure et caractéristique physique de ce type, permettrait d'élucider des problèmes de structure semblables à celui qui se pose ici pour la tautométrie entre M et Z.

En possession des caractéristiques de chaque vibreur, nous avons pu faire une étude complète des spectres IR entre 550 et 4000 cm^{-1} des acides amino-benzoïques et naphthoïques. Les résultats des tableaux I à VIII ont été regroupés en Annexe III.





II - DISTINCTION ENTRE FORMES TAUTOMERES

Il est apparu (501-539) que les acides amino naphthalène monosulfoniques sont tous -à l'état solide- sous forme zwitterionique.

La grande différence d'acidité entre les groupes $-\text{SO}_3\text{H}$ et $-\text{NH}_3^+$ explique facilement la formation d'ions internes, dans ces conditions(1). Dans le cas des acides amino carboxyliques, la situation est plus complexe, car les niveaux d'acidités des divers groupes sont très voisins, en solution aqueuse.

L'analyse précédente nous a permis de classer les divers amino acides étudiés.

(1) et on peut supposer que lors du passage de l'état dissous à l'état solide, la structure ionique est conservée.


Type I		Type II	
	On observe les absorptions A_1 A_4 A_2 A_5 A_6		On observe les absorptions D_1 D_2 D_3
	C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 C_7 C_8 C_9		E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_6 les absorptions A_1 A_2 C_4 $C_5 \dots$ ont disparu

Un exemple de la méthode qui conduit à ce classement est illustré dans le cas de l'acide amino-5 naphtoïque -1, par la figure (3) où sont comparés successivement les spectres de :

figure (3)

chlorhydrate de l'acide amino -5 naphtoïque -1
 acide naphtoïque -1
 ion naphtoate -1
 acide amino -5 naphtoïque -1

On observe très nettement le remplacement de $\nu_{C=O}$ à $(1659-1678 \text{ cm}^{-1})$ par une bande attribuable à $\nu_{C=O}$ asym D_1



Etude de
l'acide
amino-5
naphtoiue -

3

La considération de tous les spectres permet de confirmer les attributions et amène à conclure que l'acide amino -5 naphtoïque -1 est essentiellement sous forme zwitterionique, à l'état solide (1)

- (1) Nous avons pu isoler deux formes solides de cet acide, de points de fusion différents (552) dont les spectres dans KBr semblent indiquer l'existence de deux formes : l'une essentiellement zwitterionique (c'est celle que nous avons étudiée ici), l'autre essentiellement moléculaire.

Il en est de même pour tous les composés du type II.

Une conclusion contraire ne peut pas être proposée pour les composés du type I. L'existence des absorptions caractérisant les groupes $-NH_2$ et $-COOH$, ne permet pas d'affirmer que les vibreurs $-NH_2^+$ et COO^- ^(sont absents) car ces derniers absorbent dans des zones de fréquences très encombrées, et s'ils existent en faible proportion (sans doute même jusqu'à 30 ou 40%) il est pratiquement impossible de les caractériser avec certitude.

L'analyse infra-rouge permet donc seulement de faire une étude qualitative de la tautomérie MZ, elle ne permet pas de conclure à l'absence de zwitterions dans les acides

	ortho amino benzoïque
	para amino benzoïque
	amino-4 naphtoïque -1
	amino -1, -3, -4 naphtoïque -2

Au contraire, à l'état solide dans les mêmes conditions, les acides méta amino benzoïques et amino -3, -5, -6 naphtoïques -1 existent à l'état essentiellement dipolaires.

Il était intéressant de comparer ce résultat avec l'analyse de la structure des mêmes produits dans divers solvants. La plupart des solvants ne permettent pas d'obtenir des solutions assez concentrées en amino acide, pour obtenir des spectres suffisamment nets, et de plus, ces milieux présentent des absorptions gênantes dans les zones d'études.

Nous avons donc préféré poursuivre l'étude de la tautomérie MZ, en solution aqueuse (où l'on peut espérer retrouver des zwitterions, comme à l'état solide) et en solution dans un alcool (moins favorable que l'eau à l'existence de tels composés).

Plutôt que de déterminer les structures dans l'un et l'autre solvant pur, nous avons préféré utiliser une suite de mélanges eau-méthanol, ce qui nous a permis de suivre les modifications de l'équilibre de tautomérie $M \rightleftharpoons Z$ "en continu".

C H A P I T R E B

page

DEFINITIONS

20

I- DEFINITIONS

20

1°) Constantes vraies

20

2°) Constantes apparentes

21

3°) Relations fondamentales

22

II- MODIFICATION DES EQUILIBRES

22

1°) Coefficients d'activité

23

2°) Corrections de température

25

3°) Effet des ions H^+

25

4°) Effets des substituants

26

5°) Rôle du solvant

27

a) déplacement des constantes d'équilibre

27

b) évolution du taux de zwitterions

28

III- SOLVANTS MIXTES

31

1°) Comparaison des états de référence

31

2°) Conditions d'utilisation des mélanges eau-méthanol

32

CHAPITRE B : DEFINITIONS

En solution, la connaissance du pH, de la concentration globale en amino acide, et des diverses constantes d'équilibre acide-base, permet de calculer la concentration réelle de chacune des différentes espèces dans le mélange.

Après avoir défini les réactions et les constantes d'équilibre, nous examinerons les relations nécessaires au développement de cette étude.

Les solvants employés comportent des proportions variables d'eau et d'alcool, il faut donc, avant de les utiliser, préciser théoriquement les conditions dans lesquelles on peut effectuer la comparaison des résultats obtenus dans des milieux différents.

Ce chapitre, qui traite des aspects théoriques des mesures envisagées, est divisé en trois parties principales :


- définition des constantes
- modification des équilibres
- théorie des solvants mixtes

ce qui permettra de disposer de toutes les définitions et relations théoriques nécessaires au calcul des constantes d'équilibre acide-base.


I - DEFINITIONS

1° Constantes vraies :

Les équilibres du schéma IV donnés en introduction donnent des relations entre les différentes espèces en solution.






avec :




$$K_A = \frac{(Z) (H^+)}{(I^+)}$$

où (i) représente l'activité de la particule i dans la solution .



e)..... La connaissance des équations A , B , C , D , permet aussi de définir une constante d'équilibre entre les deux formes tautomères M et Z .



Ces cinq constantes correspondent chacune à un équilibre effectif . Elles seront appelées CONSTANTES VRAIES.

2° Constantes apparentes :

Du point de vue expérimental , on n'observe que deux ionisations successives de l'ion aminium I^+ , suivant les deux réactions (I) et (II) .



où X représente le mélange $M+Z$ présent dans la solution . Dans un milieu de composition déterminée , X peut être assimilé à un corps pur ; l'équilibre Z étant insensible aux variations de pH.

$$K_I = \frac{(X) (H^+)}{(I^+)}$$

$$K_{II} = \frac{(I^-)(H^+)}{(X)}$$

Cette écriture suppose la définition , arbitraire , de l'activité de X . Par définition , l'activité du mélange X sera considérée comme égale à la somme des activités des particules qui le composent . Soit :

$$(X) = (Z) + (M)$$

Cette activité n'est reliée simplement à la concentration globale que si :

$$\gamma_M \neq \gamma_Z$$

3° Relations fondamentales :

Il existe , en fait , plusieurs relations entre constantes vraies et constantes apparentes . L'examen des équations de définition conduit , après transformation , au système fondamental S :

S	K_I	=	K_A	+	K_B
	$\frac{1}{K_{II}}$	=	$\frac{1}{K_C}$	+	$\frac{1}{K_D}$
	$\frac{K_A}{K_B}$	=	$\frac{K_D}{K_C}$		

Pour pouvoir examiner les méthodes d'utilisation de S , il faut d'abord connaître les variations de milieu et de structure qui affectent les constantes d'équilibre , vraies ou apparentes , ainsi définies . Mais , de toute façon , les déterminations expérimentales ne peuvent fournir que les deux constantes apparentes . Comme on ne dispose que de trois relations pour déterminer quatre inconnues , il faudra utiliser une relation supplémentaire.

II - MODIFICATIONS DES EQUILIBRES :

Les constantes d'équilibre acide-base traduisent la loi d'action de masse appliquée à des corps en solution . Les grandeurs qui interviennent dans cette relation sont les activités des espèces qui participent à l'équilibre , abstraction faite des molécules de solvant.

Le solvant , en stabilisant plus ou moins les différentes entités qui réagissent , modifie les conditions d'équilibre.

D'autre part, les substituants, par leurs effets électroniques ou stériques, ou par leur affinité pour le solvant, perturbent la distribution des charges, donc le niveau énergétique des espèces concernées.

Enfin, de par leur définition même, les constantes d'équilibre sont sensibles aux variations de température.

Comme il n'est pas possible de comparer des mesures entre elles si elles n'ont pas été faites dans les mêmes conditions, il faut le plus souvent, corriger les déterminations expérimentales, pour les ramener à une force ionique nulle à 25°C.

On examinera donc :

- l'influence des coefficients d'activité
- l'effet de température
- l'effet de substituant
- le rôle du solvant.


1° Coefficients d'activité :

Les constantes d'équilibre font apparaître les coefficients d'activité des particules. Pour les ions monochargés, on pose traditionnellement :

$$\gamma_{i-} = \gamma_{j+} = \gamma_{\pm}$$

quels que soient i et j.

Si, abstraction faite de la participation du solvant, l'ionisation d'un acide peut s'écrire :



on définit une constante d'équilibre acide-base :

$$K = \frac{(\text{H}^+) (\text{BASE})}{(\text{ACIDE})}$$

En remplaçant le rapport (BASE)/(ACIDE) par r, on obtient :

$$\begin{aligned} \text{pK} &= \text{pH} - \log r + \log \gamma_{\text{acide}} - \log \gamma_{\text{base}} \\ &= -\log [\text{H}^+] - \log r - \log \gamma_{\text{acide}} + \log \gamma_{\text{base}} - \log \gamma_{\text{H}^+} \end{aligned}$$

Dans la suite, nous prendrons, pour simplifier les écritures :

$$\begin{aligned} \text{pH} - \log r &= \text{pK}^* \\ -\log [\text{H}^+] - \log r &= \text{pK}' \end{aligned}$$

Il a été montré que les corrections de type Debye-Hückel s'appliquent en milieu assez dilué ($\mu \leq 10^{-2} \text{ M}$), même dans le cas de solvants mixtes, aux valeurs de pK' calculées à partir des concentrations :

- soit en extrapolant à force ionique nulle les valeurs de pK' mesurées pour diverses forces ioniques .
- soit en calculant les coefficients d'activité et en écrivant :

$$-\log \gamma_{\pm} = B\sqrt{\mu}$$

pour des particules monochargées .

Les termes $\gamma_{\pm}$ relatifs aux ions sont assez bien connus, dans l'eau . Ils ont fait l'objet de nombreuses déterminations expérimentales et de travaux théoriques . Les valeurs du coefficient B , correspondant à chaque milieu mixte, ont été calculées d'après les travaux de DE LIGNY (75,76) . Ils ont permis de déterminer les termes $-\log \gamma_{\pm}$ pour diverses forces ioniques, dans tous les mélanges eau - méthanol utilisés .

B-I	- log $\gamma_{\pm}$ à 20°C.	
Solvant (1)	$\mu = 10^{-2} \text{ M}$	$\mu = 2.10^{-3} \text{ M}$
eau	0,04	0,02
S1	0,05	0,02
S2	0,05	0,02
S3	0,05	0,02
S4	0,06	0,03
S5	0,06	0,03
S6	0,07	0,03
S7	0,08	0,04
S8	0,09	0,04
S9	0,11	0,05
S9,5	0,13	0,06

(1) La signification des symboles utilisés pour différencier ces différents milieux mixtes est précisée en Annexe I .

Les termes γ_M et γ_Z , relatifs à la molécule et au zwitterion, doivent être estimés . Il est d'usage de considérer que le coefficient d'activité d'une molécule neutre est égal à 1 dans la plupart des cas . Par contre, le terme γ_Z n'a pas fait l'objet d'estimations antérieures, sauf pour certains acides aminés (3, 55 à 59) .

Dans le cas des amino acides étudiés ici, l'étude qualitative de l'un d'eux nous a permis de montrer que le coefficient d'activité du zwitterion est très voisin de celui de la molécule, pour des solutions peu concentrées .(Chapitre G-1) .

Dans la suite des calculs, nous utiliserons donc l'approximation suivante :

$$\gamma_M \approx \gamma_Z \approx 1$$

Les équations de définition deviennent alors :

$$\begin{array}{lcl} \text{acides BH}^+ & pK & \left\{ \begin{array}{l} = pK^* + \log \gamma_{\pm} \\ = pK' \end{array} \right. \\ \\ \text{acides AH} & pK & \left\{ \begin{array}{l} = pK^* - \log \gamma_{\pm} \\ = pK' - 2 \cdot \log \gamma_{\pm} \end{array} \right. \end{array}$$

2° Corrections de température :

Au laboratoire , toutes les mesures ont été faites à la température ambiante de +20°C. En raison de l'existence d'un minimum de la courbe $pK = f(t^\circ)$, situé en général entre 20° et 30° , la correction de température est très faible pour les acides carboxyliques .

Les déterminations des valeurs de ΔH et ΔS , effectuées par ailleurs (71,74) , nous ont permis d'estimer cette correction à 0,02 unité pK pour tous les milieux . On posera donc :

$$pK_{AH}^{25^\circ} = pK_{AH}^{20^\circ} - 0,02 \quad (AH = R-COOH)$$

Dans le cas des acides de type BH^+ , la température a une influence plus importante , dans cette zone , sur les variations de pK . On obtiendra des constantes à 25°C. en utilisant la relation suivante :

$$pK_{BH^+}^{25^\circ} = pK_{BH^+}^{20^\circ} - \frac{5 \cdot pK - 0,9}{298}$$

obtenue à partir des mêmes travaux (71,74,106,13) .


3° Effet des ions H^+ :

L'équilibre entre M et Z , caractérisé par la constante de tautomérie K_Z est indépendant de la concentration en protons . Par conséquent , dans un milieu déterminé (solvants , sels , température) le rapport Z/M ne dépend que de la nature de l'acide étudié .

Le pourcentage de chacune des espèces dans le mélange , de concentration globale C_0 en amino acide , est donné par :

$$\begin{aligned} \% I^+ &= \frac{[I^+]}{C_0} = \left[1 + \frac{K_I}{[H^+]} + \frac{K_I K_{II}}{[H^+]^2} \right]^{-1} \\ \% X &= \frac{[X]}{C_0} = \left[1 + \frac{[H^+]}{K_I} + \frac{K_{II}}{[H^+]} \right]^{-1} \\ \% I^- &= \frac{[I^-]}{C_0} = \left[1 + \frac{[H^+]}{K_{II}} + \frac{[H^+]^2}{K_I K_{II}} \right]^{-1} \end{aligned}$$

La connaissance de pK_I et de pK_{II} permet de calculer la répartition des différentes espèces dans la solution, en fonction de la concentration en ions $[H^+]$. Les résultats sont présentés sur la figure n° 4, en exemple :



4° Effets des substituants :

a).....

Si les effets de substituants étaient nuls, les constantes d'ionisation seraient reliées simplement à celles des corps non substitués. On aurait par exemple à 25° :

$$\left. \begin{array}{l} pK_C \\ pK_B \end{array} \right\} = pK_{\text{ion anilinium}} = 4,60 \quad (60)$$

acides aminobenzoïques

$$\left. \begin{array}{l} pK_A \\ pK_D \end{array} \right\} = pK_{\text{acide benzoïque}} = 4,20 \quad (61)$$

On mesurerait donc deux constantes K_I et K_{II} données par le système S,

$$pK_I = 4,05 \quad \text{et} \quad pK_{II} = 4,75$$

ce qui correspondrait à un taux de 71,5 % de zwitterions.

b).....

En fait, l'introduction d'un groupement sur une molécule modifie ses propriétés, et les pK vrais sont déplacés. L'effet d'un substituant x - pris au sens large - sur l'ionisation considérée, peut être représenté par l'équation :

$$\Delta_{\text{de}} pK_x = pK_0 - pK_x$$

avec pK_x représentant la constante d'ionisation de l'acide substitué par x , et pK_0 représentant celle de l'acide non substitué.

En général les valeurs des pK vrais sont différentes de celle des pK de l'acide benzoïque ou de l'ion anilinium.

La détermination des variations du taux de zwitterions nous permettra d'aborder l'examen quantitatif de ce problème .

5° Rôle du solvant :

On peut trouver dans la littérature , les constantes d'équilibre acide-base relatives à l'acide benzoïque et à l'ion anilinium , pour différents solvants purs ou mixtes .

Dans le cas des mélanges eau - alcools , la stabilisation des molécules par le solvant organique (essentiellement par solvation) entraîne une diminution de la force de l'acide carboxylique et un renforcement de l'acidité de l'aminium - pour des teneurs peu élevées en alcool - .

a) Déplacement des constantes d'équilibre :

Dans des solvants mixtes , de teneur en méthanol variable , on peut calculer les pK apparents qui caractériseraient les systèmes amino benzoïques , si les effets de substituants pouvaient être négligés . Ces valeurs calculées à partir des pK vrais de JUIILLARD (98) , de KILPATRICK et ARENBERG (99) sont rassemblées dans le tableau B-II.

B- II						
mélanges eau - méthanol						
% MeOH poids	pK_A	pK_B	pK_I	pK_{II}	K_Z	% Z
	pK_D	pK_C				
0	4,20	4,60	4,05	4,75	2,64	72,5
10	4,38	4,52	4,14	4,76	1,44	59
20	4,60	4,43	4,21	4,83	0,63	38,5
30	4,85	4,35	4,23	4,97	0,27	21
40	5,13	4,27	4,21	5,19	0,12	10,5
50	5,42	4,19	4,17	5,45	0,03	3
60	5,70	4,11	4,10	5,71	0,01	
70	6,00	4,05	4,05	6,00		
80	6,47	4,13	4,13	6,47		
90		4,40	4,40			
100	9,38	5,80	5,80	9,38		

Comme les variations de pK sont des fonctions continues de la teneur en alcool , les résultats ci-dessus peuvent être représentés par des courbes (figure 5) .

En réalité , les courbes qui représentent pK_B et pK_C en fonction de la composition du solvant diffèrent de celle qui représente l'ionisation de l'ion anilinium . Il en est de même pour pK_A et pK_D , qui ne sont pas confondues avec celle qui caractérise l'acide benzoïque . La figure devient alors plus complexe . A titre d'exemple , nous donnons la figure déduite des résultats obtenus dans le cas de l'acide méta aminobenzoïque .(figure 6).

b) Evolution du taux de zwitterions :

Pour comparer les valeurs de pK dans deux milieux différents , on définit l'expression :

$${}^S\Delta^E pK = p^S K - p^E K$$

avec l'indice S caractérisant une mesure dans un solvant S déterminé , et l'indice E caractérisant une mesure faite dans l'eau .

CHARLOT et TREMILLON (77) ont montré que la quantité ${}^S\Delta^E pK$ augmente très notablement pour les acides carboxyliques , alors qu'il ne varie que très peu lors de l'ionisation des ions aminiums si le solvant S est un alcool pur .

En accord avec ces données , la figure 6 montre que , très généralement , les courbes (1) et (3) d'une part , et (2) et (4) d'autre part , n'ont respectivement qu'un point commun (ou bien ne se coupent pas) . La **zone** (z) située à gauche de cette intersection correspond à la prédominance de la forme zwitterionique, la zone (m) située à droite , à la prédominance de la forme moléculaire de l'acide.

+).....

Lorsque $K_Z = 1$, les équations de définition du système S entraînent :

$$pK_I = pK_A - \log 2 = pK_B - \log 2$$

$$pK_{II} = pK_D + \log 2 = pK_C + \log 2$$

Inversement , le système S implique que si $K_A = K_B$, on aura $K_C = K_D$. Les deux points d'intersection - s'ils existent - correspondent au même mélange S , dans lequel $K_Z = 1$.

+).....

De façon générale , chacune des constantes vraies peut être définie à l'aide du système S , en fonction de K_I , K_{II} et K_Z

$$K_B = \frac{K_I}{1 + K_Z} \quad K_A = \frac{K_I \cdot K_Z}{1 + K_Z}$$

$$K_D = K_{II} \cdot (1 + K_Z) \quad K_C = \frac{K_{II} \cdot 1 + K_Z}{K_Z}$$


En désignant par t la teneur du mélange en zwitterions :


$$t = \frac{Z}{Z + M} \quad K_Z = \frac{t}{1 - t}$$

on obtient :

$$K_I = \frac{K_B}{1 - t} = \frac{K_A}{t}$$

$$K_{II} = K_D \cdot (1 - t) = K_C \cdot t$$





L'utilisation de solvants mixtes permet de suivre les variations de l'équilibre Z lorsqu'on change de solvant. En outre, elle permet d'obtenir une plus grande précision dans les mesures des constantes dans un milieu déterminé, par "lissage" des courbes $pK = f(S)$.

III - SOLVANTS MIXTES :

1° Comparaison des états de référence :

Les études faites dans une succession de solvants mixtes permettent de mettre en évidence un certain nombre de phénomènes qui interviennent de façon continue au niveau des solutés, lors du passage d'un solvant pur à un autre.

- solvation des diverses espèces par fixation de molécules de solvant,
- influence de la constante diélectrique sur l'activité des diverses particules présentes.

Dans les travaux de ce type, deux problèmes fondamentaux se posent toujours :

- mesure des constantes de dissociation acide-base dans chaque milieu,
- comparaison des variations de ces paramètres avec celle de la teneur en eau ou en alcool dans le solvant.

Il a été souvent montré (77,78) que les échelles de $p^S H$ ont un sens dans les milieux mixtes S. Les coefficients d'activité peuvent donc y être définis, comme dans l'eau.

Les échelles $p^S H$ peuvent être construites, comme en milieu aqueux (78), au moyen d'indicateurs colorés, à l'aide d'une électrode indicatrice (75,76), avec des solutions tamponnées.

On peut construire une échelle d'acidité par solvant S. Dans un tel milieu, on écrira, par exemple :

$$p^S K_{\text{indicateur}} = p^S H - \log r + \log \frac{s\sqrt{BH^+}}{s\sqrt{B}}$$

où les grandeurs indicées S sont rapportées à l'état standard dans un solvant mixte pur.


Par contre, l'ajustement des états de référence, les uns par rapport aux autres ; la détermination des coefficients de transfert Γ d'un milieu à un autre, reposent, en général, sur des considérations extra-thermodynamiques (105,78,3).

Il n'entre pas dans l'objet de notre travail d'analyser ces diverses méthodes, car il est possible d'éliminer l'ajustement, très délicat, des états de référence, en utilisant une référence interne, la même dans chaque milieu. La comparaison des valeurs de $\Delta_0 pK$, défini précédemment, a un sens quelles que soient les positions des diverses échelles les unes par rapport aux autres.


2° Conditions d'utilisation des mélanges eau-méthanol :

Bien que cela ne soit pas indispensable à la comparaison des constantes de dissociation dans un même solvant, les échelles d'acidité, dans les mélanges eau - méthanol, présentent l'avantage d'avoir été reliées à l'activité des ions H^+ dans les mêmes conditions (75,76). L'utilisation des coefficients $\gamma_{\pm}$ définis par DE LIGNY a déjà conduit à des déterminations dans ces milieux (81 à 85).

La comparaison des diverses méthodes de mesure a été faite par GABORIAUD (78) qui en a montré la validité sur quelques exemples



Il ne faut pas oublier, toutefois, que les milieux mixtes eau - méthanol sont des mélanges de deux solvants amphiprotiques. Six espèces de particules peuvent exister dans le solvant S "pur" :



en faisant abstraction des diverses solvatations possibles.

Par conséquent, les constantes d'équilibre acide-base mesurées sont, en fait, des constantes apparentes, avec :


$$K_a = \frac{(B)}{(BH^+)} \times [(H_3O^+) + (ROH_2^+)] \quad \text{pour les acides } BH^+$$

$$K_a = \frac{(A^-)}{(AH)} \times [(H_3O^+) + (ROH_2^+)] \quad \text{pour les acides } AH$$

Mais il a été montré (78) que pour tous les milieux de 0 à 90 % de méthanol en masse :




Dans tout ce domaine, les seules réactions à prendre en considération sont :



On pourra comparer les valeurs p^{SK} dans un même solvant - éventuellement à des températures différentes - entre elles.

On pourra également comparer des valeurs de p^{SK} pour divers milieux S, à condition de ne pas oublier que, dans chacun des deux équilibres précédents, interviennent deux couples acide - base :



C H A P I T R E C

page

DETERMINATION DES CONSTANTES	33
I- CONSTRUCTION DES ECHELLES p^S_H	33
1°) Gamme de tampons	33
2°) Choix des tampons de référence	35
3°) Méthode de mesure	35
4°) Echelles p^S_H	35
5°) Remarques	38
II- TITRAGES POTENTIOMETRIQUES	38
1°) Cas des monoacides	41
2°) Cas des diacides	41
a) titrage de la première acidité	42
b) titrage de la seconde acidité	42
III- TITRAGES SPECTROPHOTOMETRIQUES	44
1°) Cas des monoacides	44
2°) Cas des diacides	44
a) calcul par extrapolation	46
b) calcul par itérations	47
- calcul direct	47
- approximations successives	48

CHAPITRE C : DETERMINATION DES CONSTANTES

En précisant la validité des résultats obtenus dans les milieux mixtes utilisés, nous avons vu que plusieurs méthodes de détermination des constantes $p^S K$ sont utilisables. Deux techniques principales peuvent être employées dans le domaine qui nous intéresse (pH dans l'eau compris entre 2 et 6).

- mesures potentiométriques
- déterminations spectrophotométriques en milieu tamponné.

Pour pouvoir utiliser les méthodes spectrophotométriques en milieu faiblement acide, il était nécessaire de disposer d'une gamme de solutions tampons recouvrant le domaine $p^S H = f(\% \text{ MeOH})$ de manière satisfaisante. L'obtention de cette gamme permet de développer ces deux techniques dont nous donnerons les éléments de calcul.

I - CONSTRUCTION DES ECHELLES $p^S H$:

La construction des échelles $p^S H$ dans chaque milieu nécessite :

- le choix d'une gamme de tampons
- le choix de tampons de base, de $p^S H$ fixés
- une méthode de mesure

pour arriver à la présentation d'un tableau de valeurs $p^S H = f(S)$

1° Gamme de tampons :

Cette gamme doit être de préparation et d'emploi facile. Pour l'utilisation particulière envisagée ici (mesure de constantes d'acidité peu différentes les unes des autres) elle doit correspondre à des écarts de $p^S H$ voisins de 0,1 unité.

Nous avons donc opéré de la manière suivante :

La préparation des solutions se fait simplement par pesée d'un acide faible (ou d'une amine) et obtention d'une solution stock 2 M dans l'eau. Cette solution mère par dilution avec la quantité suffisante de soude (ou d'acide chlorhydrique dans le cas des amines) pour assurer la demi-neutralisation, permet d'obtenir la solution de travail 0,1 M en acide et 0,1 M en base correspondante.

Les tampons chloroacétiques, lactiques, acétiques, ont été réalisés d'abord à demi-neutralisation. L'addition de quantités croissantes d'acide chlorhydrique permet de "déplacer" ces tampons en conservant une force ionique pratiquement constante.

Les mesures de $p^S K$, par détermination spectrophotométrique, en milieu tamponné dans ces conditions, contrôlées avec un tampon de type AH ou BH⁺, à demi-neutralisation (de force ionique 0,01 M), ont montré que l'écart de pK maximum observé (0,03 unité pK) est de l'ordre de grandeur des imprécisions dues

aux manipulations .

Les mélanges tampons que nous avons sélectionnés sont regroupés dans le tableau C-1 .

Tableau C-1 acide	Symbole	CONCENTRATIONS totales				Origine
		[AH]	[B]	[Na ⁺]	[CP]	
		introduit	introduit			
Oxalique	Oo	0,2		0,1		DE LIGNY (75,76)
Succinique	So	0,2		0,1		
Acétique	Ao	0,2		0,1		GABORIAUD (81)
Mandélique	Mo	0,2		0,1		
Pyridinium	Po		0,2		0,1	
Collidinium (1)	To		0,2		0,1	
Chloracétique	Co	0,2		0,1		présent travail
	C1	0,2		0,1	0,02	
	C2	0,2		0,1	0,04	
	C3	0,2		0,1	0,06	
	C4	0,2		0,1	0,08	
Lactique	Lo	0,2		0,1		
	Lo,5	0,2		0,1	0,01	
	L1	0,2		0,1	0,02	
	L1,5	0,2		0,1	0,03	
	L2	0,2		0,1	0,04	
	L2,5	0,2		0,1	0,05	
	L3	0,2		0,1	0,06	
	L3,5	0,2		0,1	0,07	
	L4	0,2		0,1	0,08	
Acétique	Ao	0,2		0,1		
	Ao,5	0,2		0,1	0,01	
	A1	0,2		0,1	0,02	
	A1,5	0,2		0,1	0,03	
	A2	0,2		0,1	0,04	
	A2,5	0,2		0,1	0,05	
	A3	0,2		0,1	0,06	
	A3,5	0,2		0,1	0,07	
	A4	0,2		0,1	0,08	

(1) solution stock 0,1 M dans un mélange eau - méthanol à 50 % en volume

Les solutions correspondantes se conservent bien (plusieurs semaines) sauf dans le cas des couples succinique/succinate et lactique/lactate . Toutefois , les solutions concentrées (2M) de ces acides dans l'eau sont plus stables , et permettent une préparation rapide des mélanges nécessaires.


2° Choix des tampons de référence :

Les références utilisées pour construire les échelles $p^S H$ dans différents milieux sont celles définies à partir de l'activité de H^+ dans S et figurent dans les travaux de :

- DE LIGNY (75,76) : références primaires
- GABORIAUD (81) : références secondaires

3° Méthode de mesure :

Les mesures ont été faites à 20° c. en comparant les FEM : $^S E$ des deux piles :



L'électrode indicatrice est une électrode de verre Radiometer G-202-B à remplissage aqueux . L'expérience a montré : qu'une telle électrode se met en équilibre rapidement avec la solution (quelques secondes) , que les mesures sont stables , et que la réponse est linéaire jusqu'en milieu alcalin (81) .
L'électrode de référence est une demi-pile à calomel saturé , et la jonction est assurée par une solution aqueuse saturée à 20°c. en KCl .

Les solutions sont obtenues par dilution au 1/10 de tampons stock 0,1 M avec un mélange eau - méthanol de titre convenable . La préparation de S et d'une solution de tampon acétique est donnée -à titre d'exemple- en annexe IV .

4° Echelles $p^S H$:

Pour chacun des milieux mixtes S , les valeurs de $p^S H$ ont été déterminées par deux variantes de la même méthode :

- lecture du $p^S H$ inconnu d'un tampon , sur le graphe $p^S H = f(^S E)$ construit à partir des tampons de référence ;
figure n° 7
- calcul de la valeur $^S E^0$ correspondant à une valeur nulle de $p^S H$ dans la définition de $^S E$

$$^S E = ^S E^0 - 58,2 p^S H$$
 $^S E$ et $^S E^0$ étant exprimés en mV .
en prenant plusieurs valeurs de $p^S H$ (tampons de référence) .

Une illustration de chacun de ces deux calculs est donnée dans le tableau II pour un mélange S5 à $\mu = 0,01$ M et $t = 20^\circ c$.

S_E
en mV

200

150

100

50

milieu S_5

3

4

5

S_{PH}




Tableau II

Tampon / Symbole		S_E mV	p^{SH} (75)	p^{SH} (81)	S_E^O	S_E^O moyen
oxalique	Oo	218	2,40		358	
succinique	So	69,5	4,93		356,5	
mandélique	Mo	105,5		4,33	357,5	357,5
acétique	Ao	40		5,45	357	
collidinium	To	-20		6,50	358	
pyridinium	Po	96,5		4,49	358	

Tampon / Symbole		S_E mV	p^{SH} lecture	p^{SH} calcul	écart
chloracétique	Co	148	3,60	3,63	0,03
	C1	159	3,41	3,42	0,01
	C2	169	3,24	3,24	.
	C3	180	3,05	3,05	.
	C4	190 5	2,87	2,87	.
lactique	Lo,	77,5	4,81	4,82	0,01
	LO,5	84	4,70	4,69	0,01
	L1	91,5	4,57	4,57	.
	L1 5	98,5	4,45	4,45	.
	L2	108	4,28	4,29	0,01
	L2 5	117	4,13	4,13	.
	L3	130	3,91	3,91	.
	L3 5	138	3,77	3,77	.
	L4	149,5	3,57	3,57	.
acétique	Ao	40	5,45	5,45	.
	Ao,5	45	5,37	5,36	0,01
	A1	50,5	5,27	5,27	.
	A1 5	55,5	5,18	5,19	0,01
	A2	61	5,07	5,09	0,01
	A2 5	68,2	4,97	4,97	0.0
	A3	74	4,86	4,86	.
	A3 5	84	4,70	4,69	0,01
	A4	95	4,50	4,51	0,01

Les écarts observés donnent deux indications , permettant d'estimer la précision des mesures effectuées , et de vérifier la cohérence entre les divers étalons proposés .

Les **résultats** ; pour tous les milieux utilisés , sont rassemblés dans le tableau C donné en Annexe **V**.

Dans un but uniquement descriptif , les valeurs obtenues ont été utilisées pour construire un diagramme $p^{SH} = f(S)$ qui fait coïncider tous les zéros des diverses échelles , mais qui ne signifie pas que les p^{SH} sont comparables - dans cette représentation - pour plusieurs milieux S .

figures δ_A et δ_B

5° Remarques :

La stabilité des tampons a été contrôlée régulièrement : les variations de S_E , pour un tampon déterminé, sont au maximum de mV (0,02 unité $p^S H$) .

Tampon / Symbole		S_E mV dans S5 à 20°C.			
		1 jour	30 jours	60 jours	90 jours
Tableau C-III					
oxalique	Oo	218	216,5	219	218
acétique	Ao	39,5	40,5	40	40
mandélique	Mo	105,5	106	104	105,5
pyridinium	Po	96,5	.	97	96,5
chloracétique	Co	147,5	147	149	148
	C2	169	169,5	169	169
lactique	L2,5	117	116,5	117	117
	L4	149,5	.	149	149,5
acétique	A3,5	84	84,5	84,5	84

Les systèmes électrode de verre / électrode de référence évoluent lentement au cours d'une utilisation intensive . Des réajustements de S_E^0 ont été faits périodiquement (tous les 2 mois) pour compenser cette "dérive" des électrodes .

L'effet de tampon a été vérifié pour tous les acides utilisés , dans le milieu S5 avec un soluté de concentration spectroscopique (acide amino-5 naphthoïque-1 $c = 1,5 \cdot 10^{-4} M$) . Les écarts de S_E mesurés sont , au maximum , de 1 mV , et correspondent à la limite de précision des techniques utilisées .

Cette étude , dans neuf milieux eau-méthanol et dans l'eau , permet de disposer d'échelles $p^S H$ dans chaque milieu , et d'une gamme de solutions tampons . Il sera ainsi possible :

- de déterminer des valeurs $p^S K$, reliées à l'échelle $p^S H$, par titration potentiométrique comme en milieu aqueux .
- de réaliser des solutions tamponnées , de $p^S H$ déterminés , pour l'étude des amino acides par spectrophotométrie UV .

II - TITRAGES POTENTIOMETRIQUES :


Les constantes d'équilibre acide-base s'écrivent simplement , si on néglige la solvatation des différentes espèces :




Deux types de problèmes se posent alors :

- détermination de constantes " thermodynamiques "
- obtention de constantes "pures" .

Les corrections de force ionique et de température permettant d'accéder aux constantes thermodynamiques (force ionique nulle température 25°) ont été exposées au chapitre B .





Dans le cas de monoacides, la détermination de K peut être faite directement. Pour des diacides, le problème est en général plus compliqué.

1° Cas des monoacides :

Les constantes d'équilibre peuvent être déterminées par mesure de force électro-motrice pour des solutions contenant des quantités variables d'acide et de base.

$$p^S K = p^S H + \log r_B + \log f_{\pm} \quad \text{acides } BH^+$$

$$p^S K = p^S H + \log r_A - \log f_{\pm} \quad \text{acides } AH$$

Si on désigne par :

acides BH^+ $\begin{cases} c_B & \text{concentration totale en B} \\ c' & \text{concentration en } Cl^- \end{cases}$


acides AH $\begin{cases} c_A & \text{concentration totale en AH} \\ c & \text{concentration en } Na^+ \end{cases}$

dans tous les milieux où S^- est négligeable devant les autres espèces, on calcule aisément r_A et r_B :

$$r_A = \frac{c_A - c - [H^+]}{[H^+] + c}$$

$$r_B = \frac{c' - [H^+]}{c_B - c' + [H^+]}$$

La détermination de $p^S K$ se résume ainsi :



2° Cas des diacides :

Dans le cas des diacides, la proximité, sur l'échelle, des deux constantes de dissociation K_1 et K_2 rend le calcul délicat.

l'obtention de constantes "pures", car les trois espèces I^+ , X , et I^- peuvent exister simultanément (43,95),

Les seules quantités commodément mesurables sont :

- le p^H de la solution
- la concentration totale en diacide introduit c_o
- la concentration en HCl introduit c'
- la concentration en NaOH introduit c

Si on convient, comme précédemment, de se placer dans une zone où $p^S_H < 1/2 p^S_{K_S} - 1$, on aura :

S^- négligeable devant les autres espèces
et $[S^+] \equiv [H^+]$

a) titrage de la première acidité :

$$c_o = [X] + [I^-] + [I^+]$$

$$[Cl^-] - [I^-] = [S^+] + [I^+]$$

La mesure de $[S^+]$ permet de calculer la variable ${}^oE'_I$ par :

$${}^oE'_I = [S^+] \times \frac{c_o - [Cl^-] + [S^+]}{[Cl^-] - [S^+]}$$

Cette variable correspond à la quantité :

$${}^oE'_I = [S^+] \times \frac{[X] + 2[I^-]}{[I^+] - [I^-]}$$

Les constantes apparentes K'_I et K'_{II} peuvent être reliées à cette grandeur expérimentale,

$$\left| \begin{array}{l} K'_I = \frac{{}^oE'_I}{1 + e_I} \\ \text{avec } e_I = \frac{K'_{II}}{[S^+]} \left(2 + \frac{{}^oE'_I}{[S^+]} \right) \end{array} \right. \quad (1)$$

b) titrage de la seconde acidité :

Comme précédemment, on définit la variable ${}^oE'_{II}$

$${}^oE'_{II} = [S^+] \times \frac{[Na^+] + [S^+]}{c_o - [Na^+] - [S^+]}$$

correspondant à :

$${}^oE'_{II} = [S^+] \times \frac{[I^-] - [I^+]}{[X] + 2[I^+]}$$

qui peut être reliée à K'_I et K'_{II} :

$$\left| \begin{array}{l} K'_{II} = {}^oE'_{II} (1 + e_{II}) \\ \text{avec } e_{II} = \frac{[S^+]}{K'_I} \left(2 + \frac{[S^+]}{{}^oE'_{II}} \right) \end{array} \right. \quad (2)$$

Si on pose $a = \frac{K'_I}{[S^+]}$ et $b = \frac{[S^+]}{K'_I}$

on peut écrire, lorsque a et b sont petits - c'est à dire pour des valeurs de pH très inférieures à pK_I ou très supérieures à pK_{II} - :

$$K'_I \cong {}_0E'_I \quad \text{et} \quad K'_{II} \cong {}_0E'_{II}$$

Il est difficile d'opérer dans ces conditions car, alors, les quantités $c_o = [Cl^-]$ ou $c_o = [Na^+]$ sont petites devant c_o .

Une méthode d'itérations s'impose lorsque l'approximation précédente n'est plus applicable,

Les expressions (1) et (2) peuvent être transformées si on pose :

$${}_iE'_I = \frac{{}_0E'_I}{1 + {}_ia(2 + {}_in)}$$

avec ${}_ia = {}_{i-1} \frac{E'_I}{[S^+]}$
 et ${}_in = {}_{i-1} \frac{E'_I}{K'_I}$


$${}_iE'_{II} = {}_0E'_{II} \left[1 + {}_ib(2 + {}_im) \right]$$

avec ${}_ib = \frac{[S^+]}{{}_{i-1}E'_I}$
 et ${}_im = \frac{[S^+]}{{}_{i-1}E'_{II}}$

On utilisera l'approximation suivante :

$$K'_I \cong {}_iE'_I \quad \text{lorsque} \quad {}_iE'_I - {}_{i-1}E'_I < 0,01 \text{ unité pH}$$

$$K'_{II} \cong {}_iE'_{II} \quad \text{lorsque} \quad {}_iE'_{II} - {}_{i-1}E'_{II} < \dots \dots \dots$$



III - TITRAGES SPECTROPHOTOMETRIQUES :

Les rapports $[forme\ acide] / [forme\ base]$ peuvent être mesurés simplement par détermination spectrophotométrique pour les monoacides -ou pour les diacides dont les constantes sont séparées par plus de 3 unités pH - .

Les produits étudiés vérifiant la loi de Beer-Lambert (88) , les rapports r_A et r_B sont déterminés à une longueur d'onde choisie pour que les coefficients d'absorption des deux formes pures soient très différents l'un de l'autre . les imprécisions expérimentales seront les plus faibles lorsque :

$$\frac{d\epsilon}{d\lambda} \neq 0$$

mais cette condition n'est pas toujours réalisée ,

Le $p^S H$ est fixé par l'utilisation d'un tampon de force ionique 0,01 M , environ 100 fois plus concentré que l'acide à étudier , transparent dans la zone de longueur d'onde où la mesure est faite . La limite d'utilisation d'un tampon a été fixée à une absorption propre correspondant à $D = 0,010$ en cuve de 1 cm d'épaisseur . Les mesures sont faites par rapport à un témoin contenant le tampon dans les mêmes conditions .

1° Cas des monoacides :

A une longueur d'onde déterminée , la variation de la densité optique , avec le $p^S H$, d'un indicateur , est représentée par la figure 9 .

$$K^I = [S^+]_i \times \frac{d_i - d_i}{d_i - d_2}$$

Si on note :

d^+ : absorption de BH^+ pur

d_M : absorption de la forme moléculaire B ou AH

d^- : absorption de A^- pur ,




les rapports r_A et r_B se calculent par :

$$\begin{aligned} r_A &= \frac{d_M - d_i}{d_i - d^+} \\ r_B &= \frac{d^- - d_i}{d_i - d_M} \end{aligned} \quad (3)$$

2° Cas des diacides :

Dans le cas des diacides , si le rapport K_I sur K_{II} est supérieur à 1000 , les déterminations des deux constantes peuvent être conduites successivement sans difficulté , car le coefficient d'extinction de l'espèce intermédiaire peut être mesuré avec précision .

Par contre , si pK_I et pK_{II} ne diffèrent pas de plus de 3 unités pH , il n'est pas possible de les déterminer directement à n'importe quelle longueur d'onde , car on ne peut pas considérer qu'à chaque $p^S H$ déterminé , il n'existe que deux espèces en équilibre .



Toutefois, lorsque trois espèces existent simultanément, c'est à dire $[+]$, $[-]$, et $[X]$, il est possible d'utiliser deux extensions des méthodes classiques ; car X est un mélange ($M + Z$) dont la composition est indépendante du pH, et qui présente toutes les caractéristiques d'un corps pur dans les conditions d'étude choisies (température et solvant).

- La première méthode, due à THAMER et VOIGT (86), reprise par KOK-PENG-ANG (87) et BRYSON-MATTHEWS (6) consiste à extrapoler la densité optique de l'espèce intermédiaire X à concentration en $+$ et $-$ nulles.
- Il est possible, également, de déterminer exactement chacune des constantes, en se plaçant à une longueur d'onde telle que deux des trois formes aient des coefficients d'extinction égaux (points isobestiques).

a) calcul par extrapolation :

A un pH compris entre pK_I et pK_{II} , il existe, pour une mole globale de diacide :

x mole $+$
y mole $-$
(1 - x - y) mole X

on peut calculer x et y en fonction de $[S^+]$ et de K'_I et K'_{II} . Si on désigne - à une longueur d'onde déterminée λ_0 - par :

d	: absorption globale observée	} pour une même concentration c_0
d^+	: absorption de l'ion $+$ seul	
d^-	: absorption de l'ion $-$ seul	
dx	: absorption de X seul	

d peut être exprimé en fonction de d^+ , d^- , dx (87) :

$$[S^+]^2(d - d^+) + [S^+]K'_I(d - dx) + K'_I K'_{II}(d - d^-) = 0 \quad (4)$$

Dans une zone de pH assez étendue, et à une longueur d'onde convenable, la courbe $d = f(pH)$ admet un extremum (fig. 10)

Soient f_1 et f_2 deux concentration en ions $[H^+]$, correspondant à la même densité optique, l'équation (4) donne un système où K'_I et K'_{II} et dx sont inconnus. Ce système peut être transformé, en séparant K'_I et K'_{II} . Si on exprime d en fonction de dx, on obtient :

$$\begin{aligned} d &= dx + \frac{f_1 + f_2}{K'_I} (d^+ - d) \\ d &= dx + K'_{II} \times \frac{f_1 + f_2}{f_1 \cdot f_2} (d^- - d) \end{aligned} \quad (5)$$

ce qui peut s'écrire :

$$\begin{aligned} d &= dx + \frac{A}{K'_I} \\ d &= dx + B \cdot K'_{II} \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \text{avec } A &= (f_1 + f_2)(d^{\oplus} - d) \\ \text{et } B &= \frac{f_1 + f_2}{f_1 f_2} (d^{\ominus} - d) \end{aligned}$$

En traçant pour divers couples (f_1, f_2) les droites $d = f(A)$ et $d = f(B)$, on obtient les constantes K_I^I et K_{II}^I . On dispose, en outre, de deux méthodes indépendantes permettant d'obtenir dx . La comparaison des deux valeurs obtenues pour dx permet de tester la précision de la méthode, et, par conséquent, il est possible d'apprécier les incertitudes sur K_I^I et K_{II}^I .

L'utilisation de cette méthode appelle deux remarques :

- en combinant les équations précédentes, on peut obtenir le produit des deux constantes :

$$pK_I^I + pK_{II}^I = \log \left(\frac{d^{\ominus} - d}{d^{\oplus} - d} \right) - \log f_1 - \log f_2$$

- lorsque $d^{\oplus} = d^{\ominus} = d^{\oplus}$, les expressions prennent une forme simplifiée ; en écrivant $\Delta d = d^{\oplus} - d$, on arrive à :

$$A = (f_1 + f_2) \Delta d$$

$$B = \frac{f_1 + f_2}{f_1 f_2} \Delta d$$

$$f_1 f_2$$

$$pK_I^I + pK_{II}^I = -\log f_1 - \log f_2$$

b) calcul par itérations :

Il est en général possible de trouver une ou plusieurs longueurs d'ondes telles que :

$$\begin{aligned} \text{ou } \left. \begin{aligned} \varepsilon_{\oplus} &= \varepsilon_x \neq \varepsilon_{\ominus} \\ \varepsilon_{\oplus} &\neq \varepsilon_x = \varepsilon_{\ominus} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \lambda_{\alpha} \\ \lambda_{\beta} \end{aligned} \text{ figure 11} \end{aligned}$$

Dans ces conditions, il est possible d'introduire deux grandeurs opérationnelles J_I^I et J_{II}^I .

La première est calculée à la longueur d'onde λ_{α} :

$$J_I^I = \alpha [S+]_{\alpha} \frac{d^{\oplus}_{\alpha} - d_{\alpha}}{d_{\alpha} - d^{\oplus}_{\alpha}}$$

La seconde est calculée à la longueur d'onde λ_{β} :

$$J_{II}^I = \beta [S+]_{\beta} \frac{d_{\beta} - d^{\oplus}_{\beta}}{d^{\ominus}_{\beta} - d_{\beta}}$$

Ces grandeurs correspondent à :

$$J_I^I = \frac{[S+]_{\alpha} [X]_{\alpha} + [I-]_{\alpha}}{[I+]_{\alpha}} \quad J_{II}^I = \frac{[S+]_{\beta} [I-]_{\beta}}{[X]_{\beta} + [I+]_{\beta}}$$

Deux cas peuvent alors se présenter :

..... Il existe une solution de $-\log [S+]_{\alpha}$ compris entre K_I^I et K_{II}^I , pour laquelle on peut calculer, avec une précision convenable J_I^I et J_{II}^I

$$[S+]_{\alpha} \equiv [S+]_{\beta}$$

Les constantes de dissociation K_I^I et K_I' sont directement accessibles par :

$$K_I^I = [S+] \times \frac{v_I^I - v_{II}^I}{J_{II}^I + [S+]}$$

$$K_I' = v_{II}^I \times \frac{v_I^I + [S+]}{v_I^I - v_{II}^I}$$

..... Lorsque'il est difficile d'obtenir une courbe de $d = f(\lambda)$ correspondant à une valeur de p^{SH} , telle que $d_i = d_{\oplus}$ ou $d_{\ominus} = d_i$ soit trop faible pour avoir une détermination suffisamment précise, il est possible d'utiliser une technique d'itérations pour obtenir K_I^I et K_{II}^I .

En exprimant K_I^I et K_{II}^I en fonction de v_I^I et v_{II}^I on obtient :

$$K_I^I = \frac{v_I^I}{1 + \frac{K_I'}{[S+]_{\alpha}}} \quad \text{et} \quad K_{II}^I = v_{II}^I \left(1 + \frac{[S+]_{\beta}}{K_I'} \right)$$

Si on pose :

$$q = \frac{K_{II}^I}{[S+]_{\alpha}} \quad \text{et} \quad p = \frac{[S+]_{\beta}}{K_I^I}$$

on arrive à :

$$K_I^I = \frac{v_I^I}{1 + q} \quad \text{et} \quad K_{II}^I = v_{II}^I (1 + p)$$

La résolution par itérations consiste à écrire :

$$K_I^I \cong iJ_I^I \quad K_{II}^I = iJ_{II}^I$$

$$\text{lorsque} \begin{cases} |iJ_I^I - i-1J_I^I| \leq 0,02 \quad \text{et} \\ |iJ_{II}^I - i-1J_{II}^I| \leq 0,02 \end{cases}$$


avec :

$$iJ_I^I = \frac{v_I^I}{1 + iq} \quad \text{et} \quad iJ_{II}^I = v_{II}^I (1 + ip)$$

iq et ip étant définis par :


$$iq = \frac{i-1J_{II}^I}{[S+]_{\alpha}} \quad \text{et} \quad ip = \frac{[S+]_{\beta}}{iJ_I^I}$$

Le calcul est schématisé par la figure suivante :



Dans le cas des diacides, plusieurs méthodes sont donc utilisables, et sont résumées dans le tableau C-IV. Ces méthodes permettent d'obtenir les constantes p^{SK} dans les milieux eau-méthanol, correspondant aux dissociations des acides hydroxy- et amino- benzoïques et naphthoïques étudiés.

Tableau C-IV



C H A P I T R E D	page
RESULTATS EXPERIMENTAUX	50
I- ACIDES NON SUBSTITUÉS	50
II- COMPARAISON DES METHODES	52
1°) Mesures potentiométriques	53
2°) Mesures spectrophotométriques	55
a) dans les milieux riches en alcool	55
b) dans les milieux riches en eau	55
- extrapolation	56
- détermination directe	61
- itérations	62
3°) Discussion des résultats	62
III- DETERMINATION DES CONSTANTES DE DISSOCIATION	64

CHAPITRE D : RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les méthodes proposées se simplifient considérablement lorsqu'il s'agit de déterminer la constante de dissociation d'un monoacide et nous avons d'abord mesuré les pK des deux acides naphthoïques et des deux ions naphtylamoni-ums .

La précision des diverses méthodes a été ensuite testée , dans le cas d'un amino acide (acide amino-5 naphthoïque-1) . Les conclusions tirées de cette étude expérimentale ont permis de généraliser les techniques de détermination des constantes d'équilibre acide - base aux dérivés préparés ou disponibles .

I - ACIDES NON SUBSTITUES :

Pour pouvoir évaluer ultérieurement les effets de substituants , il faut disposer des constantes de dissociation des acides non substitués .



Les ionisations de type BH^+/B pourront être référées , suivant la série , aux ions anilinium , - naphtylamonium , - naphtylamonium ; alors que les ionisations des acides AH/A^- seront comparées à celles des acides benzoïque , α - naphthoïque , et β - naphthoïque .

Les constantes d'ionisation de ces divers acides ont déjà été abondamment publiées , dans l'eau , et il existe un certain nombre de déterminations dans des solvants purs ou mixtes . Le tableau D donné en Annexe V présente quelques exemples des valeurs publiées , mais les déterminations dans une suite de mélanges de solvants sont rares pour les dérivés benzéniques et inexistantes pour les dérivés naphthaléniques .

Les constantes de dissociation n'ont pas été redéterminées pour l'ion anilinium et l'acide benzoïque . Les valeurs utilisées par la suite pour ces deux acides , sont tirées de la littérature (98 et 160) .



Contrairement à ce qu'écrivent DEWAR et GRISDALE (16) , les acides naphthoïques peuvent être dosés par spectrophotométrie UV , car les spectres des formes moléculaires et ionisées présentent des différences suffisantes pour donner des valeurs de pK précises . La figure n° 12 illustre les conditions dans lesquelles les dosages spectrophotométriques ont été réalisés . Les solutions employées sont des solutions mixtes tamponnées , de force ionique 0,01 M , avec des concentrations en indicateur comprises entre 10^{-4} M et 5×10^{-4} M .

Les mesures de pK par potentiométrie ont été réalisées sur des solutions 0,2 M en acide AH et 0,1 M en Na^+ (par addition de NaOH) ou , dans le cas des amines , sur des solutions 0,2 M en amine B et 0,1 M en Cl^- (par addition de HCl) .



1 NaOH $10^{-2} N$
 2 HCl $10^{-2} N$
 3 tampon succinate
 4 tampon C_0

12



La faible solubilité des différents produits étudiés interdit d'effectuer les mesures à de telles concentrations dans les milieux riches en eau ; elles ont alors été faites sur des solutions de force ionique 2×10^{-3} M .

Les résultats de ces déterminations optiques et potentiométriques sont présentés dans le tableau A en Annexe V . Les valeurs de $p^S K$, à force ionique nulle , ont été calculées pour chacun des acides étudiés , en choisissant dans chaque cas la valeur moyenne entre plusieurs déterminations .

Ces résultats sont donnés sous forme de graphe $pK = f(S)$ dans la figure 13 , ce qui a permis d'améliorer la précision des déterminations en lisant les valeurs de pK sur la courbe moyenne passant parmi les points expérimentaux . Dans ces conditions , nous estimons que l'incertitude expérimentale sur les valeurs proposées , reste inférieure à 0,03 unité pH dans tous les milieux .

Les $p^S K$ de ces produits à 20°C. , et à force ionique nulle , sont donnés dans le tableau D-1 pour divers milieux eau - méthanol .

$p^S K$ $T = 20^\circ C.$ $\mu = 0$				
MILIEU	acides naphthoïques		ions naphtylamoniuns	
	$\alpha-$	$\beta-$	$\alpha-$	$\beta-$
eau	3,72	4,16	3,98	4,17
S 1	3,90	4,35	3,97	4,14
S 2	4,10	4,54	3,91	4,07
S 3	4,33	4,75	3,84	4,00
S 4	4,58	4,98	3,76	3,90
S 5	4,83	5,20	3,68	3,82
S 6	5,10	5,44	3,61	3,74
S 7	5,40	5,70	3,56	3,69
S 8	5,74	6,10	3,57	3,68
S 9	6,50	6,88	3,73	3,87
S 9,5	7,07	7,45	3,94	4,10

Tableau
D-1

II - COMPARAISON DES METHODES :

L'examen de la figure n° 6 montre que , pour des teneurs élevées en alcool , les constantes pK_I et pK_{II} sont notablement différentes l'une de l'autre . Au voisinage de l'eau pure , par contre , $pK_{II} - pK_I$ peut devenir inférieur à 2 unités pK . Il est facile de constater que le calcul peut être conduit simplement à partir des données expérimentales dans le premier cas , alors que dans le second , l'emploi d'une méthode complexe s'impose ,

Dans le but de comparer les résultats entre eux , et de tester la précision obtenue , les valeurs de pK_I et pK_{II} ont été déterminées par chacune des méthodes proposées dans le chapitre précédent , dans le cas de l'acide amino-5 naphthoïque-1 par mesures spectrophotométriques et par mesures potentiométriques (lorsque la solubilité le permet) .

1° Mesures potentiométriques :

Les mesures de $p^S H$ ont été faites pour deux concentrations en amino acide :


$$c_0 = 4 \times 10^{-3} \text{ M} \quad \text{et} \quad c'_0 = 2 \times 10^{-2} \text{ M}$$

et une concentration en réactif (HCl ou NaOH) égale à $c_0/2$ ou $c'_0/2$ suivant les cas .

La faible solubilité du produit utilisé ne permet pas d'étudier les milieux riches en eau , par cette méthode ,


Le tableau B donné en Annexe V regroupe les résultats obtenus dans chacun des milieux mixtes à 20° . Plusieurs déterminations de $p^S H$ ont été faites . On a retenu celles pour lesquelles l'écart des fém mesurées est inférieur à 0,5 mV - c'est à dire un écart inférieur à 0,01 unité pH - .

Un exemple d'utilisation de la méthode d'itérations est donné dans le tableau D n°2 pour le milieu S3 à $\mu = 2 \times 10^{-3} \text{ M}$.



Deux remarques peuvent être faites :

- La dissociation de la forme BH^+ peut devenir très importante lorsque la concentration en amino acide est voisine de K'_I . Il faut donc tenir compte de l'influence de la dilution sur l'équilibre acide base étudié .



- En général, les grandeurs ϵE_I^L et ϵE_{II}^L tendent très rapidement vers leur limite. Elles demeurent constantes dès que $i \geq 3$ et on peut écrire dans la plupart des cas :

$$pK' \approx -\log \epsilon E'$$

Cette méthode présente l'avantage de ne nécessiter que peu de mesures. A la limite, deux déterminations de p^SH pourraient suffire pour obtenir K_I^L et K_{II}^L . L'utilisation de la technique de calcul ne soulève pas de problème délicat, puisqu'il suffit de faire, au maximum, trois itérations successives pour atteindre les constantes thermodynamiques.

Par contre, la faible solubilité dans l'eau, des molécules étudiées, ne permet pas d'étendre cette méthode aux milieux fortement aqueux. En effet, il est difficile d'assurer la reproductibilité des mesures effectuées, en milieu tamponné à une force ionique inférieure à 0,001 M, et l'emploi de la spectrophotométrie s'impose alors.

2° Mesures spectrophotométriques :

La figure 14 montre que deux bandes d'absorption très intenses existent dans le domaine ultra-violet. L'ion I^+ présente un maximum d'absorption vers 290 nm et l'ion I^- vers 320 nm. Les positions de ces maxima sont très peu affectées par l'addition de quantités croissantes de méthanol, alors que le spectre de la forme intermédiaire X est très fortement modifié lors du changement de milieu, ce qui révèle le déplacement progressif de l'équilibre Z vers la formation de la molécule pure. Cet effet sera discuté et analysé plus loin (chapitre G).

a) dans les milieux riches en alcool :

Lorsque pK_I et pK_{II} sont nettement séparés, il existe deux faisceaux de courbes $d = f(\lambda, pH)$ présentant chacun deux points isobestiques (figure n° 15). La détermination des constantes se fait alors comme dans le cas d'un monoacide.

Ainsi, dans le milieu S9, les courbes $d = f(pH)$ à une longueur d'onde donnée permettent de mesurer pK_I et pK_{II} (figure n° 16)

- La méthode graphique à 300 nm et 370 nm donne :

$$\begin{array}{l} pK_I = 3,10 \\ pK_{II} = 6,69 \end{array} \quad \left[\begin{array}{l} pK_I^* = 3,21 \\ pK_{II}^* = 6,58 \end{array} \right]$$

- Le calcul des rapports r_A et r_B aux mêmes longueurs d'onde, conduit à un résultat analogue (14 déterminations pour r_A et 15 pour r_B)

$$\begin{array}{l} pK_I = 3,06 \\ pK_{II} = 6,69 \end{array}$$

b) dans les milieux riches en eau :

Lorsque la teneur en eau augmente, il faut utiliser une des méthodes complexes précédemment décrites, dont nous donnons ici un exemple de calcul :

..... Extrapolation

Dans l'eau , le réseau $d = f(pH_e)$ est représenté par la figure n° 17 .
A la longueur d'onde $\lambda = 300nm$, les coefficients d'absorption de I^+ et de I^- sont identiques , et l'expression C-⑥ prend une forme simplifiée ; ce qui conduit à :

$$A = (f_1 + f_2) \Delta d$$
$$B = \frac{f_1 + f_2}{f_1 f_2} \Delta d \qquad \text{avec } \Delta d = d^{\oplus} - d$$

Le tableau D-3 des valeurs de d en fonction du $p^S H$ correspondant à cette longueur d'onde permet , comme précédemment , de construire le graphe $d = f(-\log[H^+])$ figure n° 18 ,



Tableau D-3							
tampon	$p^S H$	$-\log[H^+]$	$d \times 10^3$	tampon	$p^S H$	$-\log[H^+]$	$d \times 10^3$
NaOH			802				
Hcl			802	L 2,5	3,29	3,25	622
				L 2	3,40	3,36	615
Oo	2,15	2,11	758	L 1,5	3,59	3,55	609
Mo	3,45	3,44	613	L 1	3,75	3,71	612
So	4,12	4,08	644	L 0,5	3,85	3,81	6 20
				L 0	4,03	3,99	633
C 4	2,38	2,34	736	A 4	3,65	3,61	609
C 3	2,45	2,41	727	A 3,5	3,85	3,81	617
C22	2,56	2,52	715	A 3	4,12	4,08	642
C 1	2,68	2,64	699	A 2,5	4,28	4,24	665
C 0	2,84	2,80	677	A 2	4,38	4,34	680
				A 1,5	4,47	4,43	690
L 4	2,80	2,76	685	A 1	4,55	4,51	700
L 3,5	3,00	2,96	654	A 0,5	4,63	4,59	712
L 3	3,12	3,08	640	A 0	4,75	4,71	727
$d^{\oplus} = 0,802$							


Il faut remarquer que la valeur limite de d , mise ainsi en évidence , n'est pas identique à d_x , car , dans ces milieux , K'_I et K'_{II} sont proches l'un de l'autre ,


La figure n° 18 permet le calcul des valeurs des coefficients A et B portés dans le tableau D-4. L'extrapolation , à valeurs de A et B nulles , permet d'obtenir d_x . Les pentes de chacune des droites donnent accès à K'_I et K'_{II}
figure n° 19



Ainsi , dans l'eau , on obtient :

$$\lambda = 300 \text{ nm} \quad \left| \begin{array}{l} d^{\oplus} = 0,802 \\ d^{\ominus} = 0,802 \\ dx = 0,552 \end{array} \right.$$
$$pK'_I = 2,79 \quad \text{et} \quad pK'_{II} = 4,36 \quad \mu = 0,01 \text{ M}$$
$$\theta = 20^\circ \text{C}$$









d $\times 10^3$	$d^{\oplus-d}$ $\times 10^3$	$-\log H^+$	$-\log H^+$	f_1 $\times 10^5$	f_2 $\times 10^5$	A $\times 10^5$	B $\times 10^{-3}$
752	50	2,18	4,96	661	1,097	33,1	4,21
732	70	2,38	4,76	417	1,738	29,3	4,04
712	90	2,54	4,60	288	2,512	26,2	3,62
692	110	2,69	4,45	204	3,548	22,99	3,16
672	130	2,84	4,30	145	5,012	19,5	2,69
652	150	2,99	4,15	102	7,080	16,3	2,26
632	170	3,14	3,97	72	10,72	14,1	1,94
				$d^{\oplus} = 0,802$	$dx = 0,502$		
milieu Eau					$pK_I' = 2,79$		
Tableau D-4					$pK_{II}' = 4,36$		

On peut remarquer que la quantité $(pK_I' + pK_{II}')_{\text{exp.}}$ est une grandeur facilement mesurable sur la figure n° 18. On obtient, avec une excellente précision :

$$(pK_I' + pK_{II}')_{\text{exp.}} = 7,14$$

ce qui confirme les valeurs trouvées pour chacune des deux constantes :

$$(pK_I' + pK_{II}')_{\text{calculé}} = 7,15$$

..... Autre méthode : Détermination directe :

Pour une solution tamponnée, de $p^S H$ compris entre pK_I' et pK_{II}' , il existe une courbe $d = f(\lambda)$ qui ne passe par aucun des points isobestiques (figure n° 17). Aux longueurs d'onde correspondant à ces points, il est possible de calculer les grandeurs opérationnelles φ_I' et φ_{II}' entraînant la détermination directe de K_I' et K_{II}' . Le tableau D-5 donne en exemple les résultats obtenus à l'aide d'une solution tamponnée dans le milieu Eau :

Tableau D-5	Tampon A 4 $pH = 3,65$	Solution aqueuse $[H^+] = 2,45 \times 10^{-4}$	
	$\lambda_1 = 287 \text{ nm}$		
	$\left. \begin{array}{l} d^{\oplus} = 0,943 \\ dx = 0,432 \\ d^{\ominus} = 0,432 \\ d = 0,490 \end{array} \right\}$	$\rightarrow \varphi_I' = 1,92 \times 10^{-3}$	$pK_I' = 2,79$
	$\lambda_2 = 324 \text{ nm}$		
	$\left. \begin{array}{l} d^{\oplus} = 0,172 \\ dx = 0,172 \\ d^{\ominus} = 0,652 \\ d = 0,242 \end{array} \right\}$	$\rightarrow \varphi_{II}' = 4,18 \times 10^{-5}$	$pK_{II}' = 4,32$


.....; Autre méthode : Calcul par itérations :

Aux mêmes points isobestiques, il est possible de calculer les grandeurs J_I^I et J_{II}^I pour deux solutions tamponnées de p^{SH} différents :

$$\begin{aligned} \alpha : \text{tampon C I} & \quad pH = 2,68 \\ & \quad \lambda_\alpha = 287 \text{ nm} \quad d = 0,735 \\ \beta : \text{tampon A O} & \quad pH = 4,75 \\ & \quad \lambda_\beta = 324 \text{ nm} \quad d = 0,497 \end{aligned}$$

Avec ces valeurs, on obtient :

$$[H+]_\alpha = 2,39 \times 10^{-3} \quad \text{et} \quad [H+]_\beta = 1,95 \times 10^{-5}$$



La méthode est d'utilisation simple, puisque J_I^I et J_{II}^I tendent très rapidement vers leurs limites.

3° Discussion des résultats :

Les conditions expérimentales relatives à chacune des méthodes sont présentées dans le tableau B donné en Annexe V et les résultats sont rassemblés dans le tableau D-6.

Les valeurs de pK^I obtenues par chacune des méthodes sont établies à $\theta = 20^\circ$ et pour une force ionique 0,01 M. Les constantes thermodynamiques seront présentées dans le chapitre suivant (E).

On peut remarquer dans le tableau D-6, que lorsque les conditions de mesure ne sont pas trop délicates,

- point isobestique situé dans une zone de λ où la densité optique varie trop vite,
- différence trop faible entre $d_\oplus$ et d_{minimum} lors de l'extrapolation,
- écart faible entre les courbes, pour $\alpha = \beta$
- contribution importante de la dissociation due à la dilution, dans le dosage potentiométrique

les résultats obtenus par chacune des méthodes, sont très concordants.

La méthode spectroscopique est très intéressante, car elle ne nécessite que de très faibles concentrations, et le nombre d'itérations à effectuer est toujours assez réduit. De plus, les calculs sont à la fois plus rapides et plus simples que par la méthode d'extrapolation.

Tableau D-6		Eau	S 1	S 2	S 3	S 4
milieu						
pK'_I	a	2,79	2,80	2,91		
	b	2,79	2,82	2,90	2,96	2,96
	c					
	d	2,79	2,84	2,94	2,95	2,96
	P				2,99	2,99
pK'_{II}	a	4,32	4,40	4,43		
	b	4,39	4,42	4,45	4,53	4,65)
	c					
	d	4,36	4,41	4,45	4,53	4,71
	P				4,58	4,70
milieu		S 5	S 6	S 7	S 8	S 9
pK'_I	a					
	b					
	c		2,79	2,72	2,76	3,06
pK'_{II}	d	2,90	2,78			
	P	2,90	2,80	2,72	2,75	3,10
pK'_I	a					
	b					
	c		5,06	5,36	5,66	6,49
pK'_{II}	d	4,88	5,09			
	P	4,90	5,10	5,36	5,66	6,47
milieu		S 0	S 1	S 2	S 3	S 4
$pK'_I + pK'_{II}$ (exp.)		7,14	7,24	7,34	7,47	7,68
						7,82

$$a = \alpha = \beta$$

b = itérations

S = spectroscopie

c = acidités séparées P = Potentiométrie

d = extrapolation

On peut classer les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes, dans le cas des mesures des deux constantes de dissociation.

Il apparaît très nettement que les deux meilleures méthodes à utiliser sont :

- les mesures potentiométriques, avec obtention des constantes par approximations successives, lorsque la solubilité des produits étudiés le permet.
- les mesures spectrophotométriques aux longueurs d'onde telles que $d\oplus = dx$ ou $d\ominus = dx$, et calcul des constantes par itérations.

Ce sont ces deux techniques qui seront le plus généralement employées pour déterminer les valeurs de pK_I et pK_{II} des acides amino benzoïques et naphtoïques ,
Bien entendu , lorsque les deux acidités sont nettement séparées , on emploiera soit la méthode spectroscopique habituelle , soit les mesures potentiométriques directes ,

Tableau D-2 Avantages et Inconvénients						
méthode		calculs	précision	rapidité mesures	généralité	obtention de plusieurs couples pK_I pK_{II}
spectro.	$\alpha = \beta$	simples	faible	moyenne	très faible	très diff.
	itération	assez simples	très bonne	moyenne	bonne	très facile
	extrap.	longs	bonne	faible	bonne	très diff.
potentiométrie		longs	bonne	très grande	limitée	très facile

III - DETERMINATION DES CONSTANTES DE DISSOCIATION :

En utilisant les techniques de mesure décrites , et en corrigeant les résultats obtenus , pour tenir compte :

- de l'effet de dilution
- de la proximité des deux constantes
- de l'effet de force ionique ,

nous avons obtenu les constantes de dissociation correspondant aux groupes $-COOH$ et $-NH_3^+$, à force ionique nulle et $\vartheta = 20^\circ$ pour les acides :

- 2 , -3 , -4 hydroxy benzoïques
- 2 , -3 , -4 amino benzoïques
- 2 , -5 , -6 , -7 , -8 hydroxy naphtoïques -I
- I , -3 , -5 , -6 , -7 , -8 " " " " " " " -2
- 3 , -4 , -5 , -6 , -8 amino naphtoïques -I
- I , -3 , -4 " " " " " " " -2

Constantes de dissociation apparentes à $\mu = 0$ $\vartheta = 20^{\circ}\text{C}$,
Tableau D-8

m.lieu		Acides	Eau	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9
Dérivés Hydroxylés	pK _H	B 2-	2,90	2,98	3,11	3,28	3,44	3,65	3,87	4,09	4,41	5,27
		B 3-	4,10	4,24	4,45	4,63	4,87	5,16	5,42	5,68	6,08	7,00
		B 4-	4,53	4,68	4,88	5,05	5,28	5,58	5,78	6,16	6,66	7,49
	N ₁	N ₁ 2-	3,23	3,33	3,45	3,65	3,79	3,89	4,07	4,30	4,59	5,41
		N ₁ 5-	3,85	4,01	4,15	4,36	4,63	4,90	5,23	5,50	5,86	6,71
		N ₁ 6-	3,87	4,02	4,15	4,39	4,67	4,99	5,21	5,46	5,82	6,68
		N ₁ 7-	3,99	4,13	4,33	4,53	4,79	5,13	5,40	5,62	6,04	6,86
	N ₂	N ₂ 8-	3,60	3,69	3,77	3,82	4,00	4,17	4,37	4,54	4,79	5,47
		N ₂ 1-	3,14	3,24	3,33	3,52	3,65	3,83	3,98	4,22	4,62	5,45
		N ₂ 3-	2,74	2,84	2,91	3,09	3,28	3,46	3,58	3,82	4,20	5,02
		N ₂ 5-	4,24	4,39	4,62	4,80	5,08	5,32	5,65	5,94	6,30	7,16
	N ₂	N ₂ 6-	4,37	4,52	4,74	4,94	5,15	5,49	5,74	6,01	6,36	7,25
N ₂ 7-		4,20	4,35	4,58	4,77	5,01	5,33	5,62	5,84	6,20	7,02	
N ₂ 8-		4,30	4,46	4,67	4,81	5,07	5,44	5,68	5,96	6,36	7,22	
Dérivés Aminés		pK _I	B 2-	2,10	2,13	2,10	2,00	1,90	1,79	1,65	1,54	1,51
	B 3-		3,08	3,17	3,25	3,27	3,24	3,25	3,21	3,13	3,18	3,29
	B 4-		2,39	2,39	2,33	2,28	2,20	2,05	1,95	1,81	1,84	2,16
	N ₁	N ₁ 3-	2,52	2,63	2,74	2,81	2,83	2,83	2,77	2,74	2,76	2,99
		N ₁ 4-	2,00	1,96	1,91	1,86	1,73	1,63	1,46	1,36	1,38	1,62
		N ₁ 5-	2,79	2,82	2,92	2,96	2,90	2,79	2,72	2,76	2,76	3,08
		N ₁ 6-	2,88	2,99	3,05	3,13	3,14	3,15	3,10	3,00	2,97	3,24
	N ₂	N ₂ 8-	1,67	1,88	2,05	2,23	2,39	2,50	2,57	2,62	2,72	2,91
		N ₂ 1-	1,01	0,98	0,94	0,82	0,80	0,71	0,46	0,40	0,42	0,70
		N ₂ 3-	2,41	2,45	2,45	2,47	2,41	2,40	2,30	2,24	2,26	2,54
		N ₂ 4-	2,91	2,92	2,89	2,85	2,80	2,70	2,54	2,44	2,45	2,69
	Dérivés Aminés pK _{II}	B	B 2-	5,10	5,17	5,24	5,39	5,59	5,79	5,98	6,33	6,76
B 3-			4,84	4,86	4,90	5,00	5,17	5,33	5,55	5,81	6,16	7,12
B 4-			4,96	5,07	5,28	5,47	5,73	6,01	6,20	6,54	6,96	7,82
N ₁		N ₁ 3-	4,52	4,55	4,58	4,60	4,75	4,94	5,13	5,36	5,76	6,61
		N ₁ 4-	4,84	5,05	5,19	5,45	5,72	5,98	6,22	6,55	6,93	7,68
		N ₁ 5-	4,44	4,51	4,54	4,64	4,82	5,01	5,22	5,52	5,84	6,70
		N ₁ 6-	4,55	4,58	4,61	4,69	4,87	5,10	5,34	5,64	5,94	6,78
N ₂		N ₂ 8-	4,55	4,58	4,57	4,61	4,66	4,68	4,75	4,93	5,25	6,11
		N ₂ 1-	4,96	5,07	5,22	5,37	5,56	5,85	6,18	6,48	6,85	7,73
		N ₂ 3-	4,87	4,97	5,07	5,20	5,38	5,54	5,71	5,96	6,27	7,14
		N ₂ 4-	4,49	4,61	4,78	4,94	5,12	5,37	5,63	5,87	6,26	7,13

B = acides benzoïques

N₁ = acides naphtoïques -1

N₂ = acides naphtoïques -2

C H A P I T R E E	page
METHODES D'APPROXIMATION	66
I- REACTION A	67
II- REACTION B	68
1°) Approximation de pK_B	68
2°) Approximation de ΔH°_B et ΔS°_B	70
3°) Approximation directe de K_z	70
4°) Mesures faites au laboratoire	72
III- REACTION C	73
IV- REACTION D	74
1°) Dérivés méta et para	78
2°) Dérivés ortho	80
3°) Dérivés péri	81
V- DEPLACEMENT DE L'EQUILIBRE DE TAUTOMERIE Z	82

II° PARTIE

CHAPITRE E : METHODES D'APPROXIMATION

Les constantes thermodynamiques qui viennent d'être calculées sont relatives :

- à une seule dissociation dans le cas des acides hydroxynaphthoïques et benzoïques
- à deux dissociations concurrentes pour leurs homologues aminés.

Si l'on veut établir une corrélation entre la structure des acides et leurs propriétés physico-chimiques liées à leurs constantes de dissociation, il est nécessaire d'obtenir les valeurs des constantes d'équilibre correspondant à une seule ionisation. Or les mesures effectuées précédemment ne permettent de déterminer que les deux constantes apparentes K_I et K_{II} qui figurent dans le système S.

Ce système fondamental contient 4 inconnues et 3 relations. Les constantes vraies ne peuvent donc être obtenues qu'en introduisant une hypothèse permettant de fixer l'une de ces quatre valeurs. Tout le système étant déterminé à partir de cette estimation, il faudra en examiner la validité. On verra, à cette occasion, que les résultats obtenus dans chaque cas sont concordants, ce qui constituera, a posteriori, une justification des hypothèses avancées.


Ce chapitre a pour objet de définir les hypothèses extra-thermodynamiques qui permettent de faire le calcul de chacune des constantes vraies. Les transformations reliant I^+ à M, Z et I^- étant régies par 5 équilibres, cette étude examine 5 méthodes d'approximations dont trois sont entièrement originales :

approximation de la réaction A					
"	"	"	"	B	
"	"	"	"	C	} méthodes nouvelles
"	"	"	"	D	
"	"	"	"	Z	

Les méthodes classiques (A ou B) permettent d'estimer l'effet d'un substituant par analogie avec celui d'un autre groupement. Cette technique est étendue ici à l'approximation des réactions (C et D). De plus, dans le cas présent, l'utilisation des milieux mixtes eau-méthanol permet de déplacer l'équilibre de tautomérie de façon très notable, et donc de parvenir à Z.

I - REACTION A :

CHRISTENSEN et COLL. (29) reprenant les travaux de JOHNSON (62) utilisent l'ionisation de la paratriméthylbenzobétaïne,



avec :

$$K_j = \frac{(\text{Z}_a)(\text{H}^+)}{(\text{I}_a^+)}$$

et font la convention $K_j \approx K_A$ pour calculer une valeur de K_z dans le cas de l'acide para amino-benzoïque dans l'eau. Cela suppose que les groupes $-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$ et $-\text{NH}_3$ ont des effets rigoureusement identiques sur l'ionisation de l'acide benzoïque.

Dans l'eau, les effets électroniques peuvent être assez facilement comparés. SERJEANT (40) note que les écarts de pK produits sur l'acide benzoïque par l'introduction d'un groupe

$-\text{N}^+ \begin{matrix} \text{R}_1 \\ \text{R}_2 \\ \text{R}_3 \end{matrix}$ en méta' sont proportionnels à :

Tableau E-I	R ₁	R ₂	R ₃
0,98	H	H	H
0,96	H	H	CH ₃
0,96	H	H	C ₂ H ₅
0,90	CH ₃	CH ₃	CH ₃

mais on manque de renseignements sur le comportement de ces groupes en position para de $-\text{COOH}$, et leurs effets ne sont largement étudiés que pour des solutions aqueuses.

Les mêmes auteurs (29) évaluent les termes ΔH° et ΔS° de la réaction A, à partir de déterminations calorimétriques, en prenant les moyennes de ces grandeurs correspondant à l'ionisation d'acides benzoïques substitués par des groupes attracteurs d'électrons :

$-\text{NO}_2$ $-\text{CN}$ $-\text{Br}$ $-\text{Cl}$ $-\text{I}$ $-\text{COOH}$

Une telle approximation ne se justifie :

. que si l'action globale de $-\text{NH}_3^+$ peut être assimilée effectivement à celle de groupes aussi différents que $-\text{NO}_2$, ..., $-\text{COOH}$

. et si les valeurs de ΔH° ou ΔS° utilisées sont comparables

Or

, l'effet du groupe chargé $-\text{NH}_3^+$ ne peut pas être représenté aussi simplement.

THIROT (11-15) a montré que les groupes $-\text{NO}_2$ et $-\text{CN}$ ont un effet qui peut être assimilé à un effet inductif, alors que $-\text{NH}_3^+$ provoque une variation de pK , essentiellement par effet de champ électrique à travers l'espace.

. les valeurs de ΔH° et ΔS° sont trop peu significatives dans cette zone de température où ΔG est minimum (-74 pour que cette méthode puisse être employée avec précision.

Même lorsque l'utilisation d'une valeur moyenne n'est pas justifiée du point de vue théorique, une telle méthode peut être employée si la grandeur considérée varie peu. Mais nous savons (74), dans le cas présent, que lorsque $\Delta H \approx \text{cste}$, il n'en est pas de même pour ΔS , et la validité d'une telle approximation n'est donc pas établie.

II - REACTION B :


On a montré depuis très longtemps que le remplacement d'un groupe $-\text{COOH}$ d'une molécule M par un groupe $-\text{COOR}$ -où R est un radical méthyl, éthyl, propyl, butyl (04)-ne modifie que très peu certaines propriétés de la molécule



Dans la plupart des cas, les auteurs considèrent que M et M_b possèdent les mêmes caractéristiques.

1° - Approximation de pK_B :

Dans l'étude de composés du type I^+ , le remplacement du radical acide carboxylique par un de ses dérivés d'estérification, permet d'estimer K_B au moyen de l'équilibre E :



L'hypothèse de WEGSCHEIDER (63), ADAM (01), EBERT (50), reprise très fréquemment dans la littérature :

EDSALL (23)
DEVOTO (20)
COHN - L. SALL (03)
KLOTZ - GRUEN(42)
WILLI - MEIER (100)
ROBINSON - BIGGS (04)
BRYSON (07)
BRYSON - MATTHEWS (06)
SCHMID - SIFER (43)

consiste à écrire :

$$K_B \approx K_E$$

L'ion I_B^+ étant un mono-acide, la détermination de K_E peut être faite simplement par potentiométrie, spectroscopie ou calorimétrie.

Diverses tentatives ont été faites pour estimer les variations de K_B lorsqu'on remplace $-COOH$ par $-COOR$ (101) :

- * ROBINSON et BIGGS (04) donnent des valeurs de pK_B peu différentes pour divers para amino benzoates.
- * CHRISTENSEN et COLL (29), à partir de la revue de JAFFE (103), utilisent la relation :

$$pK_B = pK_E - 0,11$$

pour l'acide méta aminobenzoïque.

- * SERJEANT (40) estime que pour $R = CH_3$, l'écart entre pK_B et pK_E décroît très rapidement lorsque la distance d , entre les deux groupes, augmente, suivant la loi :

$$pK_B - pK_E = \frac{1,59}{d^2} + 0,02 \quad d \text{ exprimé en } \text{\AA}$$

Il obtient d'autre part

$pK_B - pK_E$	$R = CH_3$	$R = C_2H_5$
méta	+ 0,09	0,03
para	0,06	0,03

Tableau
E-2

et utilise un terme correctif de signe opposé à celui de CHRISTENSEN pour calculer pK_B

- * Les mesures de pK_I et pK_B , dans le cas de l'acide amino-5 naphthoïque -I et de son ester méthylque, dans divers solvants mixtes eau-méthanol, ont montré au cours de cette étude (104) que pour une distance suffisante entre les deux groupements

$$|pK_B - pK_E| \leq 0,02 \quad \text{unité } pK$$

dès que l'équilibre de tautomérie n'intervient plus. Tableau I

* On rencontre dans la littérature (COHN -03- SCHMID -43- CHRISTENSEN -29-) des déterminations de K_Z , correspondant à des ortho amino acides, obtenues avec cette approximation de K_B . Cette méthode ne doit pas être utilisée dans ce cas et la discussion en sera faite au moment de la comparaison des résultats obtenus.

2°- Approximation de ΔH_B° et ΔS_B°

CHRISTENSEN et COLL (29) déterminent les grandeurs thermodynamiques vraies ΔH_B° et ΔS_B° de la réaction B, en se référant à l'ester méthylique, et en posant :

$$\Delta H_B^\circ \simeq \Delta H_E^\circ$$

$$\Delta S_B^\circ \simeq \Delta S_E^\circ$$

On peut remarquer que si ces auteurs font intervenir un coefficient de correction de pK égal à 0,11 "pour tenir compte des différences induites par la substitution de -COOH par -COOM", ils ne corrigent pas leurs valeurs de ΔH et ΔS , ce qui manque de cohérence.

Une telle méthode doit donc être employée avec la plus grande prudence, comme le montrent les résultats du tableau E-3

Tableau E-3

% de zwitterions obtenu par ces auteurs	acide	approximation		
		K_B	H	S
	o-aminobenzoïque	43%	9%	6%
	m- " " "	69%	60%	50%
	p- " " "	11%	2%	1%

3°- Estimation directe de K_Z :

Il est possible de déterminer complètement le système S sans calculer la valeur d'une constante vraie. En effet, le rapport (Z)/ (M) peut être estimé par diverses techniques expérimentales, qui -jusqu'à présent- se réfèrent toutes à une molécule M_b .

* KLOTZ et GRUEN (42) comparent les spectres U.V. de Mb, X et I_b^+ dans l'eau, en faisant implicitement les deux approximations :

$$(\lambda) \begin{cases} \epsilon_{Mb} \simeq \epsilon_M \\ \epsilon_{Ib^+} = \epsilon_{I^+} \simeq \epsilon_Z \end{cases}$$

où ϵ_i représente le coefficient d'absorption de l'espèce i, à une longueur d'onde λ , convenable et fixe. Pour toutes les longueurs d'onde où le système ci-dessus est vérifié, K_Z peut être déterminé facilement :


$$K_Z = \frac{(\epsilon)}{(M)} = \frac{\epsilon_{Mb} - \epsilon_X}{\epsilon_X - \epsilon_{I^+}}$$

Dans le cas de l'acide para aminobenzoïque, le taux de zwitterions est, selon ces auteurs :

Mb : ester éthylique $\rightarrow t = 9\%$

Mb : ester méthylique $\rightarrow t = 3\%$

* KUHN et GEIDER (36), en s'aidant des spectres U.V. comparent les spectres de fluorescence aux maximum d'absorption, de dérivés de la damascénine dans des solvants variés, à diverses températures, et considèrent que dans tous les milieux, M_0 est totalement sous forme Z_0 .



Le même raisonnement que précédemment permet de calculer K_Z . Ces auteurs obtiennent ainsi :

Tableau E-4

produit			
solvant, 20°	eau	benzène	benzène
t%	41%	72%	56%

Mais il n'est pas certain que les mesures dans l'eau leur aient permis d'obtenir les coefficients d'absorption des formes totalement protonées avec HCL 0, 1 N car :

$$1,3 < pK_1 < 2,15$$

Ils supposent d'autre part que M_0 est totalement sous forme Z_0 dans tous les milieux étudiés, même dans le benzène ; cette hypothèse demanderait à être contrôlée.

4° - Mesures faites au laboratoire :

Le dosage spectrophotométrique de l'acidité de l'ester méthylique correspondant à l'acide amino-5 naphthoïque-1 a été effectué en milieu tamponné ($\mu = 10^{-2} M$) dans l'eau à 20° à 290 et 340 nm. On obtient :

Solvant	pK'_E (1)	pK_E	pK_I (2)
eau	3,42	3,38	2,79
S ₁	3,41	3,36	2,82
S ₂	3,36	3,31	2,92
S ₃	3,30	3,25	2,96
S ₄	3,17	3,11	2,96
S ₅	3,03	2,97	2,90
S ₆	2,88	2,81	2,79
S ₇	2,82	2,74	2,72
S ₈	2,86	2,77	2,76
S ₉	3,18	3,07	3,08

Tableau
E-5

(1) pK'_E est la moyenne de 10 mesures effectuées dans chaque milieu

(2) Les valeurs de pK_I proviennent du tableau A-8

Nous proposons d'élargir l'éventail des méthodes d'approximation des constantes d'équilibres vraies, en considérant les deux réactions C et D successivement, en partant de considérations extrathermodynamiques de même nature que celles qui ont déjà été proposées par d'autres auteurs pour les réactions A et B.

III - REACTION C :

La réaction (C) correspond à l'équilibre :



Dans l'eau, les travaux de ROBINSON (66,67) ont montré que l'analogie de structure et de comportement des ions aniliniums et des phénols entraîne l'existence d'une relation empirique du type :

$$pK_{Ax} = a + b \cdot pK_{Px} \quad \text{eq. (1)}$$

avec pK_{Ax} = pK de l'ion anilinium substitué par x
et pK_{Px} = pK du phénol substitué par x

Cette relation, établie en série benzénique, s'applique à des dérivés variés, même lorsque un ou deux substituants se trouvent en position ortho par rapport au centre réactif, et que les règles d'additivité des effets électroniques donnent des résultats médiocres (67).

Plusieurs valeurs des coefficients de l'équation E-1 ont été proposées

	a	b	ref.
dérivés monosubstitués	-8,275	1,296	66
dérivés divers	-8,254	1,293	67
avec ortho NO ₂	-9,516	"	"
avec ortho CH ₃	-8,773	"	"

En appliquant ces valeurs au calcul du pK de l'ion anilinium, on obtiendrait :

$$9,87 \text{ (ref.51)} \leq pK \text{ phénol} \leq 10,00 \text{ (ref.65 à 67)}$$



pK anilinium

$$4,51 \text{ } \leq \text{calculé} \leq 4,68$$

$$4,51 \text{ (ref.64)} \leq \text{observé} \leq 4,67 \text{ (re. 51)}$$

On peut remarquer ainsi, que l'écart entre la valeur calculée et la valeur expérimentale dépend beaucoup des déterminations même de pK.

Par conséquent, cette méthode de corrélation entre constantes d'équilibre acide-base, pour les réactions (F) et (C) :



pourra être utilisée, à condition de déterminer les coefficients expérimentaux a et b, qui seront les plus propres à décrire les dérivés étudiés car :

- le substituant COO⁻ qui intervient, dans les ionisations (F) et (C), n'a pas encore été étudié dans une relation de ce type.
- la relation E-1 n'a été mise en évidence que pour des dérivés du benzène, et sera étendue au système naphthalénique,

Les constantes correspondant aux ionisations de naphtylamine et de naphthols diversement substitués sont rares, Seules les déterminations en solution dans l'eau sont disponibles, L'approxima-

tion de K_C sera donc faite uniquement dans ce milieu .

Les coefficients a et b ont été déterminés à partir des travaux de BRYSON et coll. (7,69) , BIGGS et ROBINSON (4) , CREAMER (37) , VANDENBELT (51) , et VIREY (38) , lorsque la gamme de substituants est assez étendue .

Faute de données suffisantes , ces paramètres ne peuvent être déterminés par une telle méthode pour toutes les positions de substitution du naphthalène . En raison de l'identité des valeurs de b pour les dérivés méta substitués , et du faible écart entre les valeurs de b correspondant aux positions méta et para en série benzénique , on suppose que la même valeur de b est applicable , avec une bonne approximation , à toutes les positions du cycle naphthalénique . On peut alors calculer le paramètre a qui correspond à chaque cas , à l'aide des mesures effectuées avec le substituant SO_3^- (38) .

Il n'existe malheureusement pas d'autre groupe pour lequel les constantes d'ionisation de naphtylamines et naphtoles aient été déterminées dans toutes les positions de substitution ; mais le groupe SO_3^- est un groupe chargé , comme COO^- , et son utilisation peut présenter deux avantages :

- Si le comportement de SO_3^- n'est pas différent de celui des groupes globalement neutres , dans les positions où on dispose de suffisamment de données pour déterminer a et b , on peut penser que COO^- doit également faire partie de la corrélation .
- Si on peut calculer les paramètres a lorsque le substituant SO_3^- est en ortho ou péri du centre réactif , cette valeur doit être utilisable dans le cas du groupe COO^- , à condition que les effets stériques (taille , empêchement de solvatation , empêchement de résonance) soient peut différents .

On peut alors écrire :

$$pK_C = a + b.pK \quad \text{eq.2}$$

avec a et b donnés dans le tableau E-6 ,

Les constantes d'acidité pK_H des acides hydroxy benzoïques et naphtoïques , ont été déterminées à 20°C , en solution aqueuse , par potentiométrie , et sont comparées avec les résultats de la littérature (Tableau E-7) .

En appliquant la relation 2 ci-dessus , on obtient la série des valeurs calculées de pK_C (Tableau E-8) .

IV - REACTION D :

L'analogie entre les groupes $-NH_2$ et $-OH$, mise en évidence par l'équation E-2 ne s'étend pas qu'aux pK des phénols et des ions aniliniums . Les effets électroniques des deux groupes -bien que d'amplitudes un peu différentes- sont de même nature et du même type .

Tableau — E - 6 —			
acide	-COO ⁻ en	a	b
benzoïque	-2	-6,82	1,13
	-3	-8,78	1,34
	-4	-8,38	1,31
naphtoïque - 1	-2	-9,80	1,20
	-3	-7,32	
	-4	-7,56	
	-5	-7,33	
	-6	-7,26	
	-7	-7,42	
	-8	-10,34	
naphtoïque - 2	-1	-10,68	1,20
	-3	-9,62	
	-4	-7,36	
	-5	-7,31	
	-6	-7,31	
	-7	-7,34	
	-8	-7,60	

Tableau — E - 7 —					
acide	-COO ⁻	PRESENT TRAVAIL	BRYSON (69)	VANDENBELT (51)	PAYAN (39)
benzoïque	-3	9,92	9,94	(9,74)	
	-4			9,31	
naphtoïque - 1	-3		9,78		
	-5	9,64			9,66
	-6	9,73			9,74
	-7	9,47			9,48
	-8	12,05			12,00
naphtoïque - 2	-3	11,57			
	-4		9,59		
	-5	9,51			9,50
	-6	9,90			
	-7	9,86			9,82
	-8	9,48			9,42

Tableau — E - 8 —		
acide	amino	pK _c calculé
benzoïque	-3	4,53
	-4	(3,82)
naphtoïque - 1	-3	4,42
	-4	
	-5	4,30
	-6	4,43
	-7	3,96
naphtoïque - 2	-8	4,06
	-3	4,26
	-4	(4,15)
	-5	4,10
	-6	4,57
	-7	4,49
	-8	3,77

Ainsi, dans les mélanges eau-éthanol à 50 % utilisés par DEWAR et GRISDALE (16) et par WELLS et ADCOCK (12), il existe une relation entre les pK des acides hydroxy naphthoïques et ceux des acides amino naphthoïques.

Une telle relation, lorsqu'elle est vérifiée, signifie que la valeur de pK_D mesurée pour le dérivé aminé, est identique à pK_D . Dans de tels milieux, le taux de zwitterions doit donc être faible. Les points correspondant aux acides amino-8 naphthoïque-2 et amino-4 naphthoïque-1 se placent nettement en dehors de la corrélation. Cela peut être dû :


- à la présence de zwitterions dans l'acide amino-4 naphthoïque-1 ; la déformation du spectre dans des milieux de composition variée, montre qu'il n'en est rien.
- à des phénomènes de conjugaison particulière.

Pour toutes les autres positions, on obtient une relation linéaire entre pK_D et pK_H .

Par conséquent, si on pose, pour tous les milieux où nous travaillons :

$$p^S K_D = {}^S \alpha + p^S K_H \quad \text{eq.4}$$

on établit une corrélation entre les équilibres (D) et (H) :



La détermination préalable (70) des pK d'acides hydroxy benzoïques et naphthoïques, a permis de montrer que, dans les conditions expérimentales choisies, la quantité :

$${}^S \Delta^E pK_H = p^S K_H - p^E K_H \quad \text{eq.5}$$





est :

- indépendante de la position du groupe -OH sur la molécule (exception faite des positions ortho et péri).
- peu dépendante de la nature du substituant. On a pu comparer les acides benzoïque, para toluique, para amino benzoïque, amino-4 naphthoïque-1, et 11 acides hydroxy naphthoïques.
- dépendante exclusivement du milieu.

Les deux amino acides étudiés ci-dessus ne présentent qu'un taux de zwitterions très faible, les acidités sont suffisamment différentes de celles des acides benzoïques et naphthoïques, pour qu'on puisse considérer que, de façon significative, pour ces produits :

$$p^S K_D = p^S K_H + \text{constante}$$

Cette constatation nous permet de généraliser la relation proposée aux pK des autres amino acides, en faisant l'hypothèse que, quand on passe de l'eau au méthanol :



$$^S \Delta_{pK_D}^E = ^S \Delta_{pK_H}^E$$

Cela revient à écrire que $^S \alpha - ^E \alpha = 0$; c'est à dire que les courbes $pK_D = f(S)$ et $pK_H = f(S)$ sont équidistantes dans tous les milieux étudiés . Le tableau E-9 montre , qu'aux incertitudes expérimentales près , cette approximation est justifiée , dans le cas des dérivés de type méta et para .

La constante $p^{SK_{II}}$ peut être exprimée à partir de p^{SK_D} et de $^S K_Z$. Par transformation de l'équation de définition du système S , on obtient :

$$\begin{aligned} p^{SK_{II}} &= p^{SK_D} + ^S \delta , \text{ avec } ^S \delta = \log(1 + ^S K_Z) \\ \text{ou} \quad p^{SK_{II}} &= p^{SK_H} + ^S \alpha + ^S \delta \end{aligned}$$

1° Dérivés méta et para :

L'approximation , justifiée par les valeurs expérimentales , permet d'obtenir p^{SK_D} de deux façons :

..... p^{SK_D} peut être calculé par rapport à p^{SK_H} du dérivé hydroxylé dans la même position :

Dès que le taux de zwitterions est inférieur à 5 % la quantité $^S \delta$ devient très petite devant $^S \alpha$, Pour les dérivés considérés , $^S \alpha$ peut alors être calculé .

On constate que , dans les milieux riches en alcool , $^S \alpha$ est constante , cela justifie en partie l'hypothèse faite

$$\begin{aligned} \alpha &= \lim_{S \rightarrow \text{alcool pur}} (p^{SK_{II}} - p^{SK_H}) \\ \text{eq. 6} \quad p^{SK_D} &= \alpha + p^{SK_H} \end{aligned}$$

..... p^{SK_D} peut être obtenu par rapport à une valeur moyenne de $^S \Delta_{pK_H}^E$, notée $^S \Delta_m$, correspondant à tous les dérivés hydroxylés en position méta et para , Cette méthode permet de calculer p^{SK_D} , même lorsque le dérivé correspondant n'est pas disponible ,

$$\begin{cases} p^{EK_{II}} - p^{EK_H} = ^E \alpha + ^E \delta & ^E \delta = \log(1 + ^E K_Z) \\ p^{SK_{II}} - p^{SK_H} = ^S \alpha + ^S \delta \end{cases}$$

$$\rightarrow ^S \Delta_{pK_{II}}^E - ^S \Delta_{pK_H}^E = ^S \delta - ^E \delta , \text{ si } ^E \alpha = ^S \alpha$$

de la même façon que précédemment , quand on tend vers l'alcool pur , $^S \delta \rightarrow 0$. On aura donc :

$$\begin{aligned} ^E \delta &= \lim_{S \rightarrow \text{alcool pur}} (^S \Delta_{pK_H}^E - ^S \Delta_{pK_{II}}^E) \\ \text{eq. 7} \quad p^{SK_D} &= p^{EK_{II}} - ^E \delta + ^S \Delta_m \end{aligned}$$

Tableau E - 9 $10^2 \cdot S \Delta^E_{pK}$

Tableau E - 9 10 ² . S Δ ^E _{pK}											
type d'acidité		acide	S1 Δ ^E	S2 Δ ^E	S3 Δ ^E	S4 Δ ^E	S5 Δ ^E	S6 Δ ^E	S7 Δ ^E	S8 Δ ^E	S9 Δ ^E
pK _H	ortho	B -2	8	21	38	54	75	97	119	151	237
		N1-2	10	22	42	56	66	84	107	136	208
		N2-1	10	19	38	51	69	88	108	148	231
		N2-3	10	17	35	54	72	84	108	146	228
	péri	N1-8	9	17	22	40	57	77	94	119	187
	méta para	B -3	14	35	53	77	106	132	158	198	290
		B -4	15	35	52	75	105	125	163	213	296
		N1-5	16	30	51	78	105	138	165	201	286
		N1-6	15	28	52	80	112	134	169	195	283
		N1-7	14	34	54	80	114	141	163	205	287
		N2-5	15	38	56	84	108	141	170	206	292
		N2-6	15	37	57	78	112	137	164	199	288
		N2-7	15	38	57	81	113	142	164	200	282
	N2-8	16	37	51	77	114	138	166	206	292	
pK _D	para	B -4	11	32	51	77	105	124	158	200	286
		N1-4	21	35	61	88	114	138	171	209	284
acide benzoïque (97)			13	32	54	79	102	129	160	197	
ac. paratoluique "			14	34	56	82	106	131	162	200	
S Δ ^E _m			15	34	54	79	109	134	164	202	288
ac. naphtoïque-1 (N1)			18	38	61	86	111	138	168	202	278
ac. naphtoïque-2 (N2)			19	38	59	82	104	128	154	194	272

Tableau E - 10 écarts de pK x 10²

Tableau E - 10 écarts de pK x 10 ⁴											
	Eau	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	
$p^{SK}_{II} - p^{SK}_H$ {	B -3	74	62	45	37	30	17	13	13	8	12
	B -4	43	39	40	42	45	43	42	38	30	33
	NI-5	59	50	39	29	19	11	-1	2	-2	-1
	(NI-6)	68	56	46	30	20	11	13	18	12	10
$s^E_{pK_H} - s^E_{pK_{II}}$ {	NI-3	12	28	46	56	67	73	80	78	79	
	NI-4	-6	-1	7	-9	-5	-4	-7	0	4	
	B2-4	3	5	9	16	21	20	26	25	24	

Tableau E - 11

Tableau E - II												
		EAU	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	α
p^{SK_D}	B -3	4,22	4,36	4,57	4,75	4,99	5,28	5,54	5,80	6,20	7,12	0,12
	B -4	4,96	5,07	5,28	5,47	5,73	6,01	6,20	6,54	6,96	7,82	0,39
	N1-5	3,84	4,00	4,14	4,35	4,62	4,89	5,22	5,49	5,85	6,70	-0,01
	N1-6	3,99	4,14	4,27	4,51	4,79	5,11	5,33	5,58	5,94	6,80	0,12
												$E \delta$
	N1-3	3,73	3,88	4,07	4,27	4,52	4,82	5,13	5,37	5,75	6,61	0,79
	N1-4	4,84	5,05	5,19	5,45	5,72	5,98	6,22	6,55	6,93	7,68	0
	N2-4	4,24	4,39	4,58	4,78	5,03	5,33	5,58	5,88	6,26	7,12	0,25

N1 = acides naphtoïques-1

N2 = acides naphtoïques-2

B = acides benzoïques

Les résultats obtenus à l'aide de ces méthodes sont présentés dans les tableaux E-10 et E-11 .


2° Dérivés orto :

La figure n° 20 montre que les acides substitués par le groupe -OH en ortho ne se comportent pas comme leurs isomères méta et para , quand la teneur en solvant organique varie .

Cela peut être interprété en remarquant que la chélation implique un moindre changement de structure du complexe de solvatation lors de l'ionisation .


Il est possible que les acides substitués en position ortho par les groupes -OH ou -NH₂ ne puissent être comparés simplement .

La comparaison des acidités relatives , par rapport à l'acide benzoïque , montre que la liaison hydrogène ne peut se faire que suivant les formules I et II .



La liaison hydrogène doit augmenter l'acidité par rapport à celle de l'acide benzoïque

pK^E 2,88
 pK^{S6} 3,84



La liaison hydrogène doit diminuer l'acidité par rapport à celle de l'acide benzoïque

acide benzoïque
4,20
5,47

5,08
5,95

La déformation des spectres des acides ortho amino benzoïques et naphthoïques , quand le solvant s'enrichit en méthanol , montre que l'augmentation de pK , par rapport à celle de l'acide benzoïque , ne peut provenir de la formation d'une liaison hydrogène , comme dans la formule II ci-dessus . Cela signifie que cet écart est dû essentiellement à l'équilibre de tautomérisation $M \rightleftharpoons Z$.

Nous supposons que - puisque cette liaison H , si même elle existe , a une influence dont on peut tenir compte - le comportement des acides substitués en ortho par le groupe -NH₂ est décrit à peu près convenablement par $S\Delta_m^-$,

Si on examine la quantité :

$$S\Delta_{pK_{II}}^E - S\Delta_m^- = (S\alpha - E\alpha) + (S\delta - E\delta) \quad \text{eq. 8}$$

le calcul montre qu'elle ne tend pas nécessairement vers une limite. Cela signifie que $S\alpha$ n'est pas constant pour les produits étudiés. Il est probable que cette variation est due aux effets de proximité des deux groupes .

Nous avons estimé que la variation de $S\alpha$ dans les milieux riches en alcool (la présence de zwitterions étant exclue) était la même que dans les milieux riches en eau , Ce qui donne une valeur

de E_δ obtenue par extrapolation (Tableau E-12 et figure n° 21)

Tableau E-12				$p^S K_D$		
	$-[(s_\alpha - E_\alpha) + (s_\delta - E_\delta)]$					
solvant	N2-1	N2-3	B - 1	N2 - 1	N2-3	B - 1
eau	0,03	0,05	0 08	4,82	4,44	4,70
S 1	0,03	0,05	0,08	4,97	4,62	4,85
S 2	0,08	0,14	0,20	5,16	4,80	5,04
S 3	0,13	0,21	0,25	5,34	4,99	5,24
S 4	0,19	0,28	0,30	5,55	5,22	5,49
S 5	0,20	0,42	0,40	5,85	5,44	5,79
S 6	0,12	0,50	0,46	6,18	5,58	6,04
S 7	0,12	0,55	0,41	6,48	5,96	6,34
S 8	0,13	0,62	0,36	6,85	6,27	6,72
S 9	0,11	0,61	0,38	7,73	7,14	7,58
E_δ	0,14	variable	0,40			

3° Dérivés péri :

Dans le cas de l'acide hydroxy-8 naphthoïque H , si on estime, là encore, que l'addition de méthanol perturbe peu les effets du groupe $-\text{NH}_2$ (il n'en est pas de même pour $-\text{OH}$... Figure n° 20) il est possible de calculer pK_D . Cependant, la teneur élevée en zwitterions - observée sur la déformation des spectres quand le milieu s'enrichit en alcool - ne permet pas de trouver une zone où $pK_D \neq pK_{II}$.

Il faut faire une hypothèse de calcul supplémentaire :

En considérant qu'au voisinage de $K_Z = 1$, les courbes $pK_D = f(S)$ et $pK_A = f(S)$ sont sensiblement équidistantes, on peut écrire :

$$\frac{K_A}{K_D} \approx \text{cte (donc indépendant de } K_Z)$$

Le système fondamental S donne alors :

$$\frac{K_r}{K} = \frac{K_A}{K_D} \times \left[K_Z + 2 + \frac{1}{K_Z} \right]$$

$$\frac{K_r}{K_Z K_r} = 1 - \frac{1}{K_Z^2}$$

Le minimum de $pK_{II} - pK_I$ correspond à une valeur nulle de $\frac{\partial}{\partial K_Z} \left(\frac{K_I}{K_{II}} \right)$, c'est à dire à $K_Z = 1$.

La détermination expérimentale du minimum de $pK_{II} - pK_I$, dans le cas de l'acide amino-8 naphthoïque-I, permet d'obtenir toutes les constantes dans le milieu correspondant :

% de méthanol en poids = 47,5 %	
$pK_I = 2,56$	$pK_A = pK_B = 2,86$
$pK_{II} = 4,71$	$pK_D = pK_C = 4,41$

Figure n° 22

On obtient alors les valeurs de pK_D dans chaque milieu, en faisant la même hypothèse que pour les dérivés ortho.

milieu	Tableau E-13	Tableau E-14
	pK_D	$pK_{II} - pK_I$
Eau	3,19	2,88
S 1	3,34	2,70
S 2	3,53	2,52
S 3	3,74	2,38
S 4	3,98	2,27
S 5	4,28	2,18
S 6	4,53	2,18
S 7	4,83	2,31
S 8	5,21	2,53
S 9	.	3,20

Une telle méthode ne doit être utilisée qu'avec précautions, et à condition de pouvoir comparer les résultats entre eux, en particulier avec ceux obtenus par une autre technique, car elle suppose :

- que la contribution des liaisons hydrogène entre $-NH_2$ et le groupe carboxylique, est faible devant les autres effets,
- que K_A et K_D sont affectés de la même manière par le changement de solvant,
- que la quantité $pK_{II} - pK_I$ varie suffisamment pour pouvoir déterminer avec assez de précision la position du minimum.

On peut noter qu'une telle méthode peut être considérée comme générale, pour étudier, en milieux mixtes, les équilibres de tautométrie. Avec les mêmes précautions, quant-à la validité des hypothèses de travail, elle a servi ultérieurement à la présente utilisation, à étudier les transformations de dérivés de la diphenylamine en milieux mixtes eau-DMSO ().

V - DEPLACEMENT DE L'EQUILIBRE DE TAUTOMERIE Z :

Indépendamment de toute hypothèse extra-thermodynamique, nous proposons une méthode nouvelle, visant à estimer la constante d'équilibre K_Z dans des milieux variés, par détermination du rapport des activités des espèces Z et M dans chacun de ces solvants.

Dans un milieu déterminé, de p^{SH} compris entre p^{SK_I} et $p^{SK_{II}}$, les quatre espèces I^+ , I^- , M , Z , existent simultanément. Le spectre d'absorption UV du dérivé étudié, à un tel p^{SH} , est en fait, le résultat de la superposition de quatre spectres correspondant à la contribution de chacune des espèces présentes dans la solution.

Les spectres des formes I^+ et I^- seules, sont facilement accessibles par variation du p^{SH} . Par contre, l'équilibre Z étant indépendant de (H^+) , on n'aura pas les spectres de M et Z purs. Tout au plus, peut-on calculer le spectre de "X seul" par correction des valeurs expérimentales, en tenant compte des

absorptions propres aux ions I^+ et I^- .

Le problème serait insoluble, si on ne pouvait pas déplacer l'équilibre Z. Comme le montrent les variations de K_A et K_B , l'augmentation de la teneur en méthanol dans le mélange, entraîne une nette diminution de K_Z , donc du taux de zwitterions.

En supposant que le changement de solvant ne modifie pas les spectres d'absorption des diverses espèces pures, on aurait pour diverses teneurs en alcool - un réseau de courbes correspondant à la figure n° 23.

Le taux de zwitterions en milieux aqueux est presque toujours inférieur à 100%. X n'est donc jamais identique à Z. Au contraire, pour des teneurs en alcool suffisantes, il n'existe pratiquement plus de Z dans la forme intermédiaire. Dans ces conditions, X est assimilable à M. Par conséquent, dans une zone de longueur d'onde convenable, le rapport Z/M peut être calculé dans chaque milieu.

En réalité, l'addition d'alcool modifie un peu les spectres d'absorption UV (vraisemblablement à cause de la modification de la solvation des espèces). Le calcul précédent ne pourra être conduit qu'en se plaçant dans des conditions telles que :

- les variations des spectres de I^+ et I^- avec la teneur en alcool soient connues,
- le spectre de M ne varie pas, ou bien ne varie que très peu sur un nombre de milieux suffisant pour que sa loi de variation puisse être estimée,
- le spectre de Z puisse être estimé. Le cas le plus favorable se présente lorsque ϵ^+ et ϵ_Z peuvent être considérés comme nuls.

Le taux de zwitterions peut ainsi être calculé directement. On en tire K_Z , ce qui permet d'obtenir les quatre constantes vraies

Un exemple de calcul complet sera donné au chapitre G dans le cas de l'acide amino-5 naphthoïque-I dont l'évolution du spectre, en milieu tamponné, de p^{SH} compris entre p^{SK_I} et $p^{SK_{II}}$, montre le passage de l'équilibre entre M et Z, à M seul.

Pour cet acide, à $\lambda = 335$ nm, l'effet de solvant sur X est insignifiant. On peut calculer K_Z en admettant que $d^+ = d_Z = 0,070$ ($c = 1,25 \cdot 10^{-4}$ M) et que d_Z est indépendant du milieu à cette longueur d'onde.

En prenant $d_M = 0,620$ et $d_M - d^+ = 0,550$, on peut calculer le taux de zwitterions dans chaque milieu. (Tableau E-15)

Cette technique a été développée ultérieurement pour tous les acides aminés étudiés dans le présent travail. Les valeurs de K_Z calculées sont présentées dans le tableau E-16 et correspondent à un taux de zwitterions donné au chapitre F (tableau F-1).

Tableau E- 15

milieu	d_X	$d_M - d_X$	$\pm \% Z$
Eau	0,202	0,418	76 %
S 1	0,245	0,375	68
S 2	0,300	0,320	58
S 3	0,387	0,233	42
S 4	0,494	0,126	23
S 5	0,600	0,020	3,5
S 6	0,625	.	.
S 7	0,622	.	.
S 8	0,613	.	.
S 9	0,616	.	.

Tableau E - 16

ac. de	λ de travail	valeurs de K_Z							
		Eau	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7
B -2	316	1,07	0,67	0,389	0,177	0,042	.	.	.
B -3	310	2,70	1,63	1,13	0,82	0,389	0,136	0,021	.
B -4	-	0,042	.	.	.	.	.	.	.
N1-3	375	4,00	2,85	1,70	0,755	0,389	0,177	0,053	.
N1-4	330	0,136	0,111	0,042	.	.	.	.	.
N1-5	335	3,16	2,12	1,38	0,725	0,300	0,042	.	.
N1-6	360	2,85	1,63	1,00	0,515	0,220	0,031	.	.
N1-8	275	!	32,4	19,0	10,0	5,4	2,8	0,82	0,177
N2-1	-	0,352	0,177	0,075	.	.	.	.	.
N2-3	335	1,50	1,04	0,695	0,470	0,266	0,124	.	.
N2-4	-	0,667	0,428	0,282	0,111	0,042	.	.	.

Chacune des méthodes qui viennent d'être exposées permet l'estimation d'une des constantes vraies appartenant au système S.

Avant de présenter globalement des valeurs définitives de ces constantes, il faut tester les valeurs données par chacune des techniques proposées, les unes par rapport aux autres.

C H A P I T R E F	page
COMPARAISON DES RESULTATS	85
I- COMPARAISON DES RESULTATS	85
1°) Précision	85
2°) Discussion de la validité des hypothèses	85
II- CRITIQUE DES METHODES	89
III- OBTENTION DES CONSTANTES VRAIES	90

CHAPITRE F : COMPARAISON DES RESULTATS

La comparaison critique des valeurs du taux de zwitterions dans chaque milieu, pour chaque produit, permet de déterminer, dans les meilleures conditions de précision, les constantes vraies relatives aux amino acides étudiés.

I - COMPARAISON DES RESULTATS :

Le tableau F - I présente les pourcentages de zwitterions calculés dans chaque cas pour tous les produits étudiés, Les méthodes notées B, C, D, Z, correspondent respectivement à l'approximation des réactions B, C, D, Z.

L'examen de ce tableau permet de faire un certain nombre de remarques concernant les résultats et les approximations proposées.

1° Précision des résultats :

Les écarts les plus importants apparaissent lorsque le taux de zwitterions est inférieur à 30 %. Il ne faut pas oublier que la détermination de K_Z , par l'intermédiaire des constantes d'équilibre acide - base, est très imprécise dans ce domaine.

L'analyse des incertitudes liées aux déterminations expérimentales (en dehors de toute discussion de la validité des hypothèses de calcul proposées) montre sur les figures n° 24 et n° 25, que, pour les conditions techniques choisies :

- ΔpK maximum estimé à 0,03 unité pK
- variation Δt sur le taux de zwitterions estimée à $\pm 8\%$ pour la méthode de déplacement de l'équilibre Z,

la meilleure précision est obtenue, dans tous les cas, en combinant aux moins deux déterminations indépendantes.

Les incertitudes sont alors :

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • méthode D ou B avec A ou C | $\Delta t \leq \pm 14\%$ |
| • méthode A,B,C, ou D avec Z | $\Delta t \leq \pm 8\%$ |

2° Discussion de la validité des hypothèses :

Les écarts entre nos valeurs du taux de Zwitterions (t) - en tenant compte des remarques qui précèdent concernant la précision des mesures - données par les différentes méthodes, sont toujours très faibles. Tableau F-I :

Tableau F - I

acide	méthode	Eau	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8
B -2	D	60	50	35	25	16	.			
	Z	52	40	28	15	4	.			
B -3	C	50								
	D	76	69	53	44	30	8	.		
	Z	73	62	53	45	28	12	2	.	.
B -4	C	7	.							
	D	6	.							
	Z	4	.							
N1-3	C	79								
	D	84	79	70	54	40	21	.		
	Z	80	74	63	43	28	15	5	.	.
N1-4	D	2	.							
	Z	12	10	4	.					
N1-5	B	75	72	60	49	26	12	3	.	
	C	73								
	D	75	70	61	49	35	20	.	.	
	Z	76	68	58	42	23	4	.	.	
N1-6	C	76								
	D	73	64	54	32	14	2	.		
	Z	74	62	50	34	18	3	.		
N1-8	D	96	95	91	87	80	61	38	18	7
	Z	100	97	95	90	74	61	45	15	5
N2-1	D	25	18	10	2	.				
	Z	26	15	7	.	.				
N2-3	D	63	55	46	37	27	17	2	.	
	Z	60	51	41	32	21	11	.		
N2-4	C	45								
	D	43	35	30	26	15	6	.		
	Z	40	30	22	18	10	4	.		
B = acides benzoïques N1 = acides naphtoïques-1 N2 = acides naphtoïques-2										

Les déviations les plus notables ne sont pas significatives . Ainsi , dans le cas de l'acide anthranilique en solution aqueuse , la différence de 8 % entre les résultats des méthodes D et Z , ne peut être attribuée avec certitude à l'existence d'une liaison hydrogène entre les deux groupes , car les autres dérivés ortho (acides amino naphtoïques) ne révèlent pas d'écart analogue . De même , il apparaît que les résultats obtenus dans le cas de l'acide amino-8 naphtoïque-1 sont concordants , quelle que soit la méthode employée .

L'examen du tableau F-2 , où sont comparés nos résultats avec ceux qui peuvent être trouvés dans la littérature permet de

Taux de zwitterions en solution aqueuse à 20°


Tableau F - 2

méthode.	acides benzoïques amino -			N-1 amino -	N-2 amino -	origine	ref.
	-2	-3	-4	-3	-4		
et $\frac{Z}{D}$	54	78	4	83	44	PRESENT TRAVAIL	
A			8			CHRISTENSEN	29
A	9	60	1			CHRISTENSEN	29
B	5	50	2			" "	29
B	43	69	9			CHRISTENSEN	29
		71	14			" "	29
	17	70	11			COHN - EDSALL	3
		66	9			WILLI - MEIER	100
		67		83	36	BRYSON	6
		73		86	48	SERJEANT	40
			4			ROBINSON-BIGGS	4
			12			" " "	4
	34		17			SCHMIDT (10°)	43
			53			SCHMIDT (25°)	43
	48					STROH	110
	41	78	13			DEVOTO	20
LFER	50			10		THIROT	11
	40					LEGGATTE - DUNN	35


faire un certain nombre de remarques :

- Les valeurs du taux de zwitterions proposées dans ce travail , pour les acides aminobenzoïques , sont tout à fait en accord avec celles qui peuvent être déduites des travaux de BRYSON et MATTHEWS (6) , après application de la correction proposée par SERJEANT (40) , lorsque les valeurs de K_z sont disponibles . C'est le cas des dérivés substitués en position méta .
- Les valeurs du taux de zwitterions proposées dans la littérature pour l'acide anthranilique , sont très diverses. Elles varient de 5 à 66 % . Cette grande dispersion est due à la variété des hypothèses faites :

- L'approximation de la réaction B est difficilement justifiable , car $-COOH$ et $-COOCH_3$ ne peuvent - en ortho - être considérés comme des groupes strictement équivalents , ne serait-ce que du seul point de vue stérique . Les mesures de SCHMIDT et coll. (43) ne sont pas utilisées , car l'expérience montre que K_z diminue avec l'élévation de température , contrairement à ce qu'écrivent ces auteurs .
- Les déterminations calorimétriques et potentiométriques de CHRISTENSEN et coll. (29) font intervenir trop d'approximations , pour pouvoir conduire à des valeurs sûres de t .
- La valeur obtenue dans ce travail : 54 % dans l'eau à 20° est comparable à celle de DEVOTO (20) obtenue par des mesures de constante



24



25

diélectrique , à celles de THIROT (11,15) calculées sur la base des relations d'enthalpie libre , et à celle de LEGGATTE et DUNN (35) résultant de la mesure des pK d'acides anthraniliques substitués en -4 et -5 .

..... La valeur proposée pour l'acide paraamino benzoïque (4 %) est en bon accord -compte tenu de l'imprécision des mesures dans cette zone- avec les données bibliographiques en écartant , là encore , les valeurs de SCHMIDT , pour les mêmes raisons que précédemment . L'analyse de la déformation du spectre par addition de méthanol , montre qu'il ne peut absolument pas exister plus de 10 % de zwitterions à 20° dans l'eau (SCHMIDT donne 53 % à 20°) .

II - CRITIQUE DES METHODES :

La comparaison des résultats montre que les valeurs du taux de zwitterions obtenues par chacune des méthodes proposées ,*sont tout à fait concordantes ; ce qui justifie les approximations que nous avons faites , sinon individuellement , au moins globalement .*

Le tableau F-3 permet de classer les avantages , les inconvénients qui résultent de l'emploi de chacune de ces techniques , et peut donc servir de base de référence pour le choix d'une ou plusieurs méthodes de résolution du problème posé par l'équilibre de tautomérie de composés semblables à ceux que nous avons étudiés ici .

Tableau F - 3

méthode	utilisation	inconvénients	avantages
A	utilisation difficile (une seule mention dans la littérature)	préparation délicate des composés comportement des substituants $-NH_3^+$ et $-NMe_3^+$ variable	peut être utilisée dans un seul milieu (l'eau par exemple)
B	utilisation très fréquente	manque de précision dans le cas de dérivés substitués en positions voisines	préparation facile des composés, bonne analogie de comportement entre les deux groupes $-COOH$ et $-COOMe$, peut être utilisée dans un seul milieu
C	méthode nouvelle	nécessité d'établir une corrélation préalable aussi précise que possible entre pK de phénols et d'amoni- ums en nombre important	bonne analogie entre les acidités des phénols et celles des amoni- ums , même pour des substituants chargés, peut être utilisée dans un seul milieu

	acidité	acide	% de Méthanol en masse								
			Eau	10	20	30	40	50	60	70	80
Tableau F - 5	pK _B	B -2	2,43	2,34	2,20	2,02	1,85	1,69	1,57	1,52	1,55
		B -3	3,68	3,63	3,56	3,47	3,36	3,26	3,16	3,13	3,18
		B -4	2,42	2,38	2,30	2,21	2,09		1,85	1,81	1,90
		N1-3	3,25	3,22	3,17	3,09	2,99	2,86	2,76	2,76	2,82
		N1-4	2,05	1,99	1,89	1,78	1,64	1,50	1,38	1,36	1,44
		N1-5	3,41	3,36	3,28	3,19	3,05	2,87	2,74	2,73	2,85
		N1-6	3,45	3,41	3,35	3,28	3,22	3,13	3,04	2,97	3,01
		N1-8	3,28	3,24	3,16	3,06	2,94	2,83	2,73	2,72	2,92
		N2-1	1,15	1,05	0,94	0,80	0,67	0,53	0,42	0,40	0,65
		N2-3	2,80	2,76	2,69	2,60	2,48	2,36	2,26	2,23	2,33
		N2-4	3,15	3,09	3,01	2,91	2,77	2,60	2,47	2,43	2,51
		Tableau F - 6	pK _C	B -2	4,83	4,80	4,74	4,66	.		
B -3	4,70			4,70	4,67	4,64	4,61	4,55	.		
B -4	3,78			.							
N1-3	4,42			4,40	4,36	4,32	4,27	4,21	.		
N1-4	3,8			.							
N1-5	4,33			4,32	4,31	4,30	4,24	4,10	.		
N1-6	4,40			4,36	4,29	4,19	4,06	.			
N1-8	4,55			4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,27	4,00	.
N2-1	4,27			4,25	4,23	.					
N2-3	4,64			4,67	4,72	4,75	4,13	(3,88)	.		
N2-4	4,11			4,14	4,16	4,11	4,01	.			
Tableau F - 7	pK _D			B -2	4,77	4,95	5,16	5,42	5,.	5,96	6,22
		B -3	4,24	4,44	4,66	4,90	5,18	5,45	5,72	6,02	6,50
		B -4	4,93	5,11	5,35	5,60	5,87	6,14	6,43	6,80	7,34
		N1-3	3,80	3,95	4,20	4,44	4,70	4,97	5,25	5,53	6,04
		N1-4	4,81	5,03	5,30	5,58	5,86	6,15	6,44	6,75	7,18
		N1-5	3,82	4,02	4,23	4,52	4,81	5,11	5,41	5,71	6,14
		N1-6	3,98	4,15	4,40	4,67	4,95	5,24	5,53	5,82	6,22
		N1-8	2,96	3,23	3,54	3,85	4,14	4,44	4,74	5,05	5,51
		N2-1	4,82	5,02	5,24	5,49	5,75	6,06	6,39	6,70	7,12
		N2-3	4,48	4,64	4,88	5,13	5,37	5,62	5,87	6,14	6,55
		N2-4	4,24	4,40	4,67	4,95	5,22	5,50	5,78	6,09	6,57
		Tableau F - 8	Taux de zwitterions en %	B -2	54	40	26	13	5	.	
B -3	78			68	52	35	20	9	2	.	
B -4	4			.							
N1-3	83			75	60	43	26	14	4	.	
N1-4	6			.							
N1-5	76			66	50	35	19	7	2	.	
N1-6	73			60	43	27	11	3	.		
N1-8	98			96	91	81	64	45	25	11	(.)
N2-1	22			13	5	.					
N2-3	62			50	39	27	16	5	.		
N2-4	44			33	23	13	5	.			




acides amino benzoïques (B) et naphtoïques-1 (N1) et -2 (N2)





acides amino benzoïques (B) et naphtoïques-1 (N1) et -2 (N2)

Les constantes vraies de ces tableaux permettent de construire les diagrammes $pK = f(S)$, mettant en évidence tous les équilibres entre les formes I^+ , I^- ; M , Z , dans l'eau et divers milieux mixtes eau-méthanol à 20°.

Les figures n° 26 à 29 page 93 montrent les exemples les plus caractéristiques.

En solution aqueuse, à 20°C, le taux de zwitterions, dans le mélange X, pour chacun des produits étudiés au cours de ce travail, est donné ci-dessous :





C H A P I T R E G

page

MODIFICATIONS DE L'EQUILIBRE DE TAUTOMERIE Z	94
I- EFFETS DE FORCE IONIQUE	94
II- EFFET DE SOLVANT	95
1°) Conditions d'étude	95
2°) Obtention du spectre de Z pur	96
III- EFFET DE TEMPERATURE	101
1°) Calcul du taux de Z à des températures variées	106
2°) Détermination des constantes vraies	109
3°) Obtention du spectre de Z pur	110
IV- CONCLUSION	115

CHAPITRE G : MODIFICATIONS DE
L'EQUILIBRE DE TAUTOMERIE (Z)

Nous disposons maintenant , des constantes vraies d'équilibre acide-base des acides amino benzoïques et naphtoïques . Les structures en solution aqueuse à 20° sont précisées .

La conformation d'un amino acide , en solution , résulte de la combinaison de deux types de facteurs :

- facteurs structuraux , liés aux positions relatives des deux groupes $-NH_2$ et $-COOH$ dans la molécule ,
- facteurs externes , tenant compte essentiellement de la plus ou moins grande stabilisation, des espèces en présence, par les solvants .

L'étude des facteurs structuraux fait l'objet de la troisième partie de ce travail (analyse et traitement quantitatif des effets de substituants et de solvants sur les équilibres acide-base .

Ce chapitre traite particulièrement de l'utilisation des facteurs externes pour déplacer l'équilibre de tautomérisation Z d'un amino acide .

Les constantes d'équilibre sont reliées aux potentiels chimiques des diverses espèces en présence dans la solution . Les variables principales qui affectent ce potentiel , sont :

- la force ionique
- le solvant
- la température

Nous envisagerons successivement l'influence de ces paramètres sur la formation des zwitterions .

I - EFFETS DE FORCE IONIQUE :

On trouve dans la littérature (3,55 à 59) , des mesures montrant que , pour les acides aminés , le coefficient d'activité γ_Z du zwitterion est très voisin de celui de la molécule γ_M , jusqu'à des forces ioniques assez élevées (0,5 M) .

Nous donnons ici un exemple de vérification , dans le cas de l'acide amino-5 naphtoïque-1 , en solution dans le milieu S3 , pour des forces ioniques comprises entre 0,001 M et 0,5 M . La figure n° 35b montre que la variation de pK_I est inférieure à 0,05 unité pK (c'est à dire une variation relative de 2 %) . Cela signifie que les variations relatives de γ_Z et γ_M sont

du même ordre de grandeur.

L'approximation $\gamma_Z \simeq \gamma_M$ est donc largement justifiée dans les milieux utilisés.

Les variations de pK_{II} sont également extrêmement faibles, et conduisent à la même conclusion.

Dans ces limites, on ne peut donc pas modifier, de façon notable, l'équilibre Z par effet de force ionique.

II - EFFET DE SOLVANT :

L'utilisation de solvants mixtes de composition variable, permet de modifier, de façon très importante, l'équilibre de tautomérie Z.

L'évolution du taux de zwitterions, lorsqu'on passe de l'eau au méthanol, est représentée par la figure n° 30.

Le remplacement de Z par M, lorsqu'on utilise des mélanges solvants de teneur croissante en méthanol, a déjà été illustré, lors de l'estimation du taux de zwitterions dans le mélange X (chapitre E). Une technique semblable peut également être employée pour obtenir, par le calcul, le spectre correspondant à chacune des formes pures en solution.

1° Conditions d'étude :

En milieu tamponné, de $p^S H$ compris entre $p^S K_I$ et $p^S K_{II}$, le spectre de la forme X est sensible à la teneur en méthanol dans le solvant. La figure n° 31 montre le passage de l'équilibre entre M et Z, à la forme M seule, lorsque le milieu mixte s'enrichit en alcool.

Bien entendu, dans le mélange étudié coexistent, le plus souvent, les quatre espèces I^+ , I^- , M et Z. Il faut donc, dans un premier temps, obtenir le spectre de X seul avant d'étudier sa déformation.

Le $p^S H$ de la solution étant fixé, $p^S K_I$ et $p^S K_{II}$ étant connus, il est aisé de calculer les teneurs en I^+ , I^- , X dans le mélange. (Tableau G-1).

Tableau G - 1

milieu	% I^+	% I^-	% X
Eau	10,3	13,2	76,5
S 2	11,8	13,1	75,1
S 3	12,0	12,0	76,0
S 4	8,3	12,3	79,4
S 5	9,3	7,7	83,0
S 6	7,1	5,4	87,5
S 7	3,5	5,5	91,0
S 8	2,5	4,4	94,1
S 9	1,0	3,0	96,0

répartition des différentes espèces

correspondant aux solutions tampons utilisées.

La connaissance des absorptions propres des ions I^+ et I^- , notées d^+ et d^- , dans tous les milieux, représentées sur la figure n° 32, permet de calculer l'absorption de X seul,

car dx est donné par la relation :

$$dx = \frac{d \text{ observé} - d \oplus \times \% I^+ - d \ominus \times \% I^-}{\% X}$$

Le calcul point par point, de 5 en 5 nm entre 270 et 370 nm, du spectre UV de la forme X seule, permet de tracer la figure n° 33, où sont représentées les variations d'absorption du mélange M + Z, de composition variable, lorsque la teneur en méthanol augmente dans le milieu solvant.

2° Obtention du spectre de Z pur :

La figure n° 33 montre qu'à 335 nm, le spectre de X seul est pratiquement insensible à la teneur du mélange en méthanol, dès que celle-ci est supérieure à 55 % en masse. On peut estimer que dans ces conditions, seul M existe, et ne subit pas d'effet de solvant. L'affaiblissement de la bande d'absorption, quand on examine les milieux de plus en plus riches en eau, doit être attribué au remplacement progressif de M par Z.

Si on fait l'hypothèse que Z absorbe comme I^+ , à cette longueur d'onde, on peut calculer la teneur en zwitterions dans chaque milieu (C'est ce que nous avons fait au chapitre E).


Il est difficile de faire ce calcul à toute longueur d'onde, car le spectre d'absorption de M pur, entre 55 et 100 % de méthanol n'est pas invariant. En estimant, cependant, que les déplacements des bandes d'absorption sont faibles, pour des teneurs inférieures à 50 % de méthanol, on peut considérer que le spectre de X dans le milieu S6 représente assez bien le spectre de M dans tous les milieux plus riches en eau - en sachant très bien qu'une telle approximation ne peut conduire qu'à un résultat approché.



Il est alors possible de calculer le spectre de Z pur.

Ce calcul a été fait pour les milieux S0 (Eau) à S3, où la teneur en zwitterions est importante, et voisine de 50 %.

Le tableau G-2 donne un exemple de ce calcul, à partir des valeurs observées de la densité optique de l'acide amino-5 naphthoïque-I en solution dans le milieu S1. Les pourcentages de chacune des formes présentes dans le mélange sont tirés du tableau G-1.

Les résultats obtenus, dans chacun de ces quatre milieux sont concordants, et montrent que le spectre de Z, comme celui de I^+ , est pratiquement insensible à l'effet de milieu. On peut donc représenter sur la même figure (n° 34) les spectres d'absorption des quatre espèces I^+ , I^- , M, Z, ramenés à une solution aqueuse, alors que ni M, ni Z ne peuvent être obtenus seuls dans un tel milieu, et que Z ne peut pas non plus être obtenu seul à cette température.






λ nm


360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260

33



D.O.

	λ_{nm}	ϵ
I ⁺	290	11.000
Z	285	10.900
M	335	6.000
I ⁻	312	8.400



34




Tableau G - 2

λ nm	D observé $\times 10^3$	$d_{\oplus}$ $\times 10^3$	$d_{\ominus}$ $\times 10^3$	d_x $\times 10^3$	d_M $\times 10^3$	d_Z $\times 10^3$
270	641	675	275	702	775	670
272	678	735	287	740	610	794
274	703	795	305	760	479	876
276	722	850	334	762	386	925
278	736	915	368	778	329	970
280	769	980	403	808	294	1,028
282	811	1,025	441	851	286	1,090
284	848	1,090	477	884	285	1,140
286	852	1,125	513	878	294	1,128
288	818	1,150	550	823	306	1,042
290	822	1,160	587	822	312	1,036
295	756	1,100	680	727	360	884
300	616	880	772	557	398	627
305	494	700	830	411	439	399
310	417	550	872	323	469	260
315	392	395	875	310	511	224
320	366	305	853	292	548	183
325	334	195	822	268	596	127
330	314	85	775	264	617	113
335	276	65	625	245	625	81
340	238	50	480	222	601	59
345	206	45	355	201	582	37
350	181	40	260	187	526	41
360	124	30	190	137	443	6
370	93	25	133	117	364	11

III - EFFET DE TEMPERATURE :

Le déplacement de l'équilibre Z, obtenu lors de la stabilisation de la molécule par effet de solvant, peut aussi être réalisé en faisant varier la température du milieu d'étude.

Le refroidissement diminue la solubilité des différentes espèces et, de ce fait, le potentiel chimique des solutés, dans une solution de titre donné, augmente lorsque la température décroît. Une étude préalable (71) confirme pleinement cette idée, et montre que le refroidissement d'un solvant mixte produit des déplacements relatifs d'acidité très importants.



Les mélanges eau-méthanol peuvent être refroidis considérablement par rapport à la température ambiante, et rester parfaitement transparents (72). Lorsqu'on dissout, dans de tels mélanges, une amine aromatique B en présence d'une quantité d'HCl suffisamment faible pour que la forme protonée BH^+ ne se forme pratiquement pas à température ambiante, le tracé des spectres d'absorption à des températures de plus en plus basses forme un faisceau isobestique, traduisant la protonation progressive de l'amine quand la température décroît. On obtient le p^sK de la réaction :



à diverses températures , et on en déduit l'enthalpie de la réaction .

L'étude comparative , réalisée à ce propos (71) , du pK et de la solubilité de la métanitroaniline , à différentes températures , dans divers mélanges eau - méthanol , montre que , pour les milieux riches en alcool , la constante de dissociation et la concentration de la solution saturée de la forme moléculaire , évoluent de la même façon lorsque la température varie (Figure n° 35) .

Cela signifie que la plus grande partie de l'énergie mise en jeu dans la réaction ci-dessus , correspond à la solvatation de la forme B par le méthanol .





Ainsi , lorsque la température décroît , la forme B , devenue moins stable , est plus facilement attaquée par le proton solvaté. Les variations de solubilité des formes ioniques BH^+ et H^+ s'additionnent . Une étude en cours , en liaison avec ce travail , des effets de température sur les ionisations d'ions BH^+ et d'acides AH (74) à permis de montrer que :

" L'enthalpie d'ionisation des acides carboxyliques R-COOH reste voisine de 1 kcal-mole⁻¹ et dépend assez peu de la nature de R . Dans le cas des ions R-NH_3^+ , au contraire , ΔH° augmente rapidement lorsque la force de l'acide décroît . La nature du radical R intervient donc d'une manière très différente sur l'acidité de ces deux familles de composés : l'effet des substituants porte principalement sur l'entropie d'ionisation dans le cas des acides carboxyliques , et sur l'enthalpie d'ionisation dans le cas des ions amoniuns " .


Dans le cas des amino acides , la situation est plus complexe , car les constantes d'ionisation mesurées sont des constantes apparentes .

Les figures n° 36 et 37 montrent que le refroidissement d'un mélange tamponné , suffisamment riche en méthanol pour que seul M existe (éventuellement en présence de I^+ et I^-) à température ordinaire , ne déplace pas l'équilibre entre M et I^- (fig. n° 36) . L'effet de température affecte donc de façon très semblable l'acidité des groupements $-\text{COOH}$ de l'indicateur et du tampon. Celle de l'ion I^+ est fortement affaiblie , et l'emploi d'un tampon un peu plus acide (figure n° 37) montre le remplacement progressif du mélange $\text{M} + \text{I}^-$ par le zwitterion Z , accompagné d'une faible quantité de l'ion I^+ .

Si le mélange peut être refroidi suffisamment pour faire évoluer complètement l'équilibre Z vers la formation de zwitterions purs l'obtention du spectre de Z , en particulier lorsqu'il est différent de celui de l'ion I^+ , permet d'obtenir trois types de résultats :



36



6 ml MeOH(S₆)
c = 10⁻⁴ M

① — I⁺ à 20°

② — 20°

③ — -5°


④ — -15°


⑤ — -40°

⑥ — -50°

tampon Acet.0

0,4 —
reglage à 500nm
chg. lampe 350nm
0,3 —
0,2 —
0,1 —







- Le taux de zwitterions est calculable à toute température, les coefficients d'absorption de toutes les espèces présentes dans la solution étant connus,
- La connaissance de sK_Z , p^sK_I , p^sK_{II} , p^sK_B à ces diverses températures, permet de déterminer les constantes vraies à toutes températures,
- L'obtention directe et rapide du spectre de Z pur, permet de contrôler les résultats obtenus par le calcul exposé plus haut.

1° Calcul du taux de Z à des températures variées :

Dans un milieu déterminé, la composition du mélange X peut être calculée au moyen de quelques approximations simples.

a)....

Le refroidissement d'une solution tamponnée (tampon A3 dans le milieu S6) de l'acide amino-5 naphthoïque-1, permet de suivre les variations de l'équilibre entre M et Z (figure n° 37).

La connaissance de p^sK_I , p^sK_{II} et p^sH entraîne celle de la répartition des diverses espèces dans la solution à 20°

Tableau G - 3	$\Theta = 20^\circ$	$p^sH = 5,01$	% I+ = .
	$\mu = 0,01 \text{ M}$	$p^sK'_I = 2,86$	% I- = 42 %
	milieu S6	$p^sK'_{II} = 5,16$	% M = 555 %
	tampon A3	$\dagger \%$	% Z = 3 %

L'examen de la figure n° 34 montre qu'il existe des zones privilégiées correspondant à un point isobestique entre deux formes, et des absorptions à peu près équivalentes pour les deux autres. Ceci peut être précisé par l'obtention du spectre de Z pur, et comparaison des absorptions propres de chaque espèce.

Tableau G - 4

λ nm	point isobestique entre	absorptions équivalentes pour
$\lambda_1 = 307 \text{ nm}$	I+ et I-	M et Z
$\lambda_2 = 342 \text{ nm}$	M et I-	I+ et Z
$\lambda_3 = 285 \text{ nm}$	I+ et Z	M et I-

Si on fait l'hypothèse que les points isobestiques ne se déplacent, ni en longueur d'onde, ni en densité optique (après avoir éventuellement tenu compte de la seule correction de contraction du mélange solvant) lorsque la température varie, on peut calculer les pourcentages d'espèces prises deux à deux (Tableau G-5)

On obtient ainsi, à chaque température, 3 relations entre M, Z, I+, I-. Il faut fixer l'une de ces quatre inconnues pour déterminer l'ensemble. On retrouve là le problème soulevé par l'obtention des constantes vraies à 20° (chapitre E). Il est logique d'étendre à toutes les températures les méthodes d'approximation proposées à température ambiante.

La méthode la plus commode , dans le cas présent , correspond à l'utilisation de la protonation de l'ester méthylique dérivant de l'acide étudié . Comme à 20° , on pose :

$$pK_B \approx pK_E$$

ce qui revient à dire que , dans un milieu déterminé , pour toute température :

$$\% I_B^+ \approx \% I^+$$

Le taux de I_B^+ peut facilement être calculé dans le milieu d'étude choisi (solvant S6 , tampon A3) . On obtient : (G-6) :

Tableau G - 5

λ nm	ϵ	20°	-6°	-15°	-30°	-42°	-50°	-61°
307	% (M + Z)	58	59	61	63	66	69	74
	% (I ⁺ + I ⁻)	42	41	39	37	34	31	26
342	% (I ⁺ + Z)	3	17	22	33	43	52	64
	% (M + I ⁻)	97	83	78	67	57	48	36
285	% (M + I ⁻)	97	88	83	73	62	53	40
	% (I ⁺ + Z)	3	12	17	27	38	47	60

Tableau G - 6

température	% I _B ⁺
20°	.
0	.
-15	2
-30	3
-45	7
-58	13
-65	17




milieu S6
tampon A3

On obtient alors , la répartition des différentes espèces dans la solution , en fonction de la température (figure n° 38) . Le taux de zwitterions à toutes températures se calcule aisément (tableau G-7) .

Tableau G - 7

température	+ %	K _Z	pK _Z
20	5	0,0526	1,279
10	12,5	0,143	0,845
0	20,5	0,258	0,588
-10	28	0,389	0,410
-20	36	0,563	0,250
-30	43	0,755	0,120
-40	51	1,04	-0,017
-50	59	1,44	-0,158
-60	66,5	1,98	-0,296

pK_A et pK_B pouvant s'exprimer linéairement en fonction de 1/T , au dessous de 0°C (74) , il doit en être de même pour pK_Z . La figure n° 39 montre qu'en raison des approximations faites, on





peut considérer que l'équilibre z :



correspond à une réaction assez fortement exothermique . Dans le milieu S6 (53 % de méthanol en masse) $\Delta H = -5,0 \text{ kcal.mole}^{-1}$.

b)....

Cette technique , utilisée dans le cas de l'acide amino-8 naph-toïque-I , entre -54° et $+57^{\circ}$ dans le milieu S5 , conduit à :

Tableau G - 8

température	+ %	K_z	pK_z	$10^3/T$
57	19	0,235	0,63	3,03
45	28	0,389	0,41	3,14
39	34	0,515	0,29	3,20
29	42	0,725	0,14	3,31
23	48	0,925	0,03	3,38
20	53	1,15	-0,06	3,42
19	54	1,17	-0,07	3,43
10	56	1,27	-0,10	3,54
- 3,5	66,5	1,96	-0,29	3,72
-12	74,5	2,92	-0,47	3,83
-20,5	81,5	4,40	-0,64	3,97
-29	89	8,10	-0,91	4,10
-37,5	94	15,7	-1,16	4,25
-44,5	95			4,37
-50				
-53,5				

voir figure n° 45

L'évolution du taux de zwitterions , et le calcul de ΔH dans ce milieu sont représentés sur la figure n° 40 .

On obtient , pour ce produit , une valeur de ΔH correspondant à la réaction :



$$\Delta H = -5,9 + 0,2 \text{ kcal.mole}^{-1}$$

ce qui signifie bien que le zwitterion de l'acide amino-8 naph-toïque-I est plus stable que celui de l'acide amino-5 naph-toïque-I comme on l'a montré au cours de l'étude statique de la conformation des produits , en solution à 20° .

On peut , d'autre part , remarquer que la valeur de ΔH est constante au moins jusqu'à $+40^{\circ}$; les minima des courbes pK_A et $pK_D = f(1/T)$ relatives à cet acide , sont donc reportés au delà de cette température .

2° Détermination des constantes vraies :

Il est possible d'obtenir , à chaque température , les constantes d'équilibre vraies , à l'aide de l'approximation B .


Dans le cas de l'acide amino-5 naph-toïque-I , dans le milieu S5 , on a pu , ainsi , disposer des quatre constantes vraies , en utilisant la constante de dissociation relative à l'ester méthylique

Les valeurs mesurées et les constantes calculées , figurant dans le tableau G-9 , ont été reportées sur la figure n° 41 , d'où proviennent les valeurs de ΔH .

Tableau G - 9

	p^{SK}_I	p^{SK}_{II}	p^{SK}_B	p^{SK}_A	p^{SK}_C	p^{SK}_D	+ %
20	2,90	5,01	2,97	3,76	4,20	4,90	14
10	3,04	5,02	3,15	3,77	4,29	4,92	18
0	3,20	5,08	3,32	3,79	4,49	4,94	25
-10	3,34	5,15	3,52	3,82	4,67	4,97	32
-20	3,48	5,25	3,72	3,85	4,88	4,99	42
-30	3,62	5,34	3,94	3,89	5,03	5,05	52
-40	3,76	5,54	4,18	3,98	5,22	5,13	62
-50	3,88	5,74	4,42	4,04	5,58	5,20	72
$\Delta H =$ kcal.mole ⁻¹ à -30°			+6,1	+1,7	+6,2	+1,4	

La mesure ΔH correspondant à la réaction $M \longrightarrow Z$, est tout à fait en accord avec ce qui avait été obtenu dans le milieu S6 .



Cela peut être interprété , si on considère que , dans les milieux suffisamment riches en méthanol , les réactions :



conduisent toujours aux mêmes solvates (au moins pour les produits étudiés ici) .


3° Obtention du spectre de Z pur :


a).....


Le refroidissement de l'acide amino-5 naphthoïque-1 dans divers mélanges eau-méthanol , en solution tamponnée de p^SH convenablement choisi à 20° , montre (tableau G-10) que , pour un abaissement de température suffisant , il est possible d'obtenir la transformation complète de X en zwitterion - même lorsqu'il est presque totalement sous forme moléculaire à +20° - .


Le spectre de Z est pratiquement le même dans ces divers milieux , ce qui confirme l'hypothèse d'obtention d'un solvate de structure fixe . Il possède une bande d'absorption semblable à celle de l'ion I^+ ($\epsilon_Z = \epsilon_{I^+}$) , mais très faiblement décalée vers les grandes fréquences d'environ 5 nm . La figure n° 42 révèle le passage de M seul à Z pratiquement pur dans le milieu S7 .

Le calcul du taux de zwitterions dans ces différents milieux confirme la valeur de ΔH (-5,1 + 0,3 kcal.mole⁻¹) proposée pour la réaction de formation du zwitterion .
















Tableau G - 10

+ % à 20°	20° p ^s K _I	20° p ^s K _{II}	tampon	minimum atteinte avant congélation	milieu	obtention du spectre de	+ % max.
30	2,96	4,82	Co	-40°	S 4	I ⁺ + Z	80
14	2,90	5,01	L3	-68°	S 5	I ⁺ + Z	88
5	2,79	5,22	L2	-91°	S 6	Z seul	93
.	2,72	5,52	L2	-114°	S 7	Z seul	97

b)....

Une telle étude, concernant les acides amino benzoïques, permet de montrer que le décalage observé entre les longueurs d'onde correspondant aux absorptions maximum de Z et de I⁺ est, là encore, de 5 nm (figure n° 43).

Tableau G - 11

acide benzoïque	$\lambda_{\text{max}, I^+}$	$\lambda_{\text{max}, Z}$	$\lambda_{\text{iso}, M/I^+}$	$\lambda_{\text{iso}, Z/I^+}$
o-NH ₂	271 279	267 275		
m-NH ₂	282 290	278 287	292	289
p-NH ₂	aucune apparition sensible de Z (107)			

c)....

La technique de refroidissement en milieu mixte, a été utilisée dans un cas particulièrement intéressant. L'acide amino-8 naphthoïque-1 permet de suivre l'équilibre de tautomérisation sur toute la gamme des milieux mixtes employés ici.

Dans un mélange à 44,3 % de méthanol en masse, le taux de zwitterions à 20° est voisin de 50 %. L'enregistrement des spectres d'absorption UV dans une solution tamponnée de p^sH = 4,50 (A4) à 20°, sur une gamme de température très étendue (de -54° à +57°) permet de suivre la transformation de Z en M (voir le tableau G-8).

On obtient alors la figure n° 45.

IV - CONCLUSION :

Alors que, jusqu'à présent, le mélange M+Z devait être considéré comme un corps pur vis à vis des réactions acide-base, dont la composition ne pouvait être obtenue qu'à l'aide d'approximations visant à établir, a priori, les propriétés d'un des groupes présents sur la molécule ou le zwitterion, ce travail montre que des méthodes "dynamiques" nouvelles, permettent d'étudier ce mélange, en perturbant l'équilibre entre M et Z :

- soit par addition de solvant organique,
- soit par abaissement important de température.

Ces méthodes permettent, d'autre part, d'acquérir des renseignements importants sur les grandeurs thermodynamiques fondamentales relatives à chaque équilibre.

L'écriture de ΔH et ΔS , pour chaque réaction simple, entraîne :

$$\begin{aligned} \Delta H_Z &= \Delta H_A - \Delta H_B \\ \text{ou} \quad \Delta H_Z &= \Delta H_D - \Delta H_C \end{aligned}$$

Nous avons vérifié expérimentalement (la précision est assez faible) qu'il en est bien ainsi.

C'est pourquoi, lorsque ΔH_A (ou ΔH_D) est très faible devant ΔH_B (ou ΔH_C), on a pu conclure, comme EDSALL et BLANCHARD (23), que la chaleur de réaction Z est pratiquement égale à celle de la réaction B ou C. C'est effectivement le cas pour les amines aliphatiques.

Cette étude apporte une contribution déterminante au problème évoqué par ces auteurs :

"L'élévation de température augmente la concentration en molécules au détriment des zwitterions. Cet effet peut être d'une importance considérable dans le cas des acides amino benzoïques, dans lesquels K_Z est voisin de 1 à température ambiante.

Les variations de température doivent produire des modifications importantes dans les propriétés de ces substances".

Ce travail montre qu'il en est bien ainsi, et qu'avec un abaissement de température suffisant, on peut, dans certains cas, en milieu mixte, obtenir la forme zwitterionique de l'acide, pure.

C H A P I T R E H

page

RELATIONS D'ENTHALPIE LIBRE

117

I- RELATIONS D'ENTHALPIE LIBRE

117

1°) Equation de TAFT

117

2°) Equation de DEWAR

117

3°) Equation de THIROT

118

II- ACIDES DE TYPE AH

118

1°) Valeurs expérimentales

118

2°) Détermination des paramètres

119

3°) Calcul des Δ_o pK

121

III- ACIDES DE TYPE BH⁺

121

IV- CONCLUSION

124

Les équilibres qui commandent la répartition des diverses espèces issues d'un amino acide sont de deux types (BH^+/B et AH/A^-) dont l'un et l'autre peuvent être examinés du point de vue des relations linéaires d'enthalpie libre ("LFER").

Si le changement de nature du substituant X , et son déplacement sur la molécule, n'introduisent que des perturbations faibles dans l'énergie totale de l'acide, dont les effets sont additifs, il est possible de relier les variations de pK aux modifications des grandeurs représentant les diverses actions électroniques du substituant.

Pour les acides étudiés, cette façon d'opérer est thermodynamiquement justifiée, puisque - à basse température - dans un cas, seules les variations de ΔH sont significatives (BH^+), et que dans l'autre, celles de ΔS sont prépondérantes (AH) (74). De plus, de nombreux auteurs font état de relations entre ΔH et ΔS au voisinage de 25° pour les composés étudiés (200)-(129).

Ce chapitre présentera deux études distinctes :

- Relation entre les variations d'enthalpie libre d'acides AH . On examinera le comportement de trois substituants : $-OH$, $-NH_2$, $-NH_3^+$ en solution aqueuse à 20° .
- Relation entre les variations d'enthalpie libre d'acides BH^+ , pour deux substituants : $-COOH$ et $-COO^-$.

I - RELATIONS D'ENTHALPIE LIBRE :

Les effets de substituants ne peuvent être estimés, en série benzénique et naphthalénique, qu'au moyen de trois relations (200)

1° Equation de TAFT :

Les constantes de réaction ρ_I et ρ_R traduisent la sensibilité du centre réactif aux sollicitations de nature inductive (I) ou résonante (R). Les constantes de substituant σ_I et σ_R mesurent le pouvoir du substituant à se manifester par effet inductif ou par résonance :

$$\Delta_i pK = \rho_I \sigma_I + \rho_R \sigma_R \quad \text{eq. 1}$$

2° Equation de DEWAR :

Les constantes desubstituant F et M sont relatives respectivement, à l'effet de champ, et à la possibilité de résonance. r_{ij} représente la distance évaluée en nombre de liaisons $C-C$ entre X et le centre réactif Y . π_{ij} mesure la sensibilité du système transmetteur aux effets des doublets libres.

$$\Delta_i pK = \frac{F}{r_{ij}} - M \pi_{ij} \quad \text{eq. 2}$$

3° Equation de THIROT ;

L'établissement de cette relation , la signification des paramètres , ont été présentés par ailleurs (200) . On peut dire , succinctement , que P, r, s, k, q caractérisent la réaction alors que $\sigma_x^H, \Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, E_x, \Delta\sigma_x$ décrivent les divers effets de substituants .

$${}_0\Delta_i \text{ pK} = P(\sigma_x^H - r\Delta\sigma_1 - s\Delta\sigma_2) + k \frac{E_x}{d} - q \Delta\sigma_x \quad \text{eq.3}$$

II - ACIDES DE TYPE AH :

1° Valeurs expérimentales :

Les déterminations de ${}_0\Delta_i \text{ pK}$ dans l'eau , correspondant aux acides amino et hydroxy benzoïques et naphtoïques , qui font l'objet de cette étude , sont rassemblées dans le tableau H-1

Tableau H - 1				
$IO^2, p_i \text{ pK}$	Valeurs expérimentales dans l'eau à 20° PRESENT TRAVAIL			
acide	substituant position	pK_D -NH ₂	pK_H -OH	pK_A -NH ₃ ⁺
benzoïque	-2	-57	130	183
	-3	-	10	99
	-4	-73	- 33	63
naphtoïque - 1	-2	-	49	-
	-3	- 8	-	109
	-4	-109	-	72
	-5	-10	-13	79
	-6	-26	-15	69
	-7	-	27	-
naphtoïque - 2	-8	76	12	202
	-1	-66	102	258
	-3	-32	142	154
	-4	- 8	-	88
	-5	-	- 8	-
	-6	-	-21	-
acides de référence	-7	-	-	-
	-8	-	-14	-
	acide benzoïque	pK = 4,20		
	acide naphtc	pK = 3,72		
	acide naphtoïque-2	pK = 4,16		

Les valeurs déjà publiées par d'autres auteurs sont rassemblées dans le tableau H - 2 .

Tableau H - 2					
$10^2 \Delta_i pK$ acide	substituant position	dans l'eau		dans eau/éthanol à 50% en volume	
		-NH ₂	-NH ₃ ⁺	-NH ₂	-NH ₃ ⁺
benzoïques	-2				
	-3	- 9	95		
	-4				
naphtoïques -1	-2				
	-3	14	101		9 (1)
	-4			-109 (1)	- 9 (1)
	-5			- 20 (1)	- 10 (1)
	-7				- 12 (1)
	-8				- 15 (1)
					131 (3)
naphtoïques -2	-1				
	-3				
	-4	- 9	82	- 13 (2)	- 1 (2)
	-5				- 4 (2)
	-6				(2)
	-7			- 23 (2)	- 14 (2)
	-8			- 1 (2)	- 22 (2)
(1) = ref. (2) = ref. (3) = ref.					

2° Détermination des paramètres :

Les valeurs de $\Delta_i pK$ calculées à partir de l'ensemble des travaux sur les dérivés naphtoïques (tableau H - 3) nous ont permis d'obtenir, dans des conditions assez satisfaisantes, les paramètres caractérisant la transmission des divers effets électroniques dans les équations 1 à 3 selon les méthodes décrites par leurs auteurs. En série benzénique les coefficients utilisés sont ceux proposés par TAFT, DEWAR, ou THIROT.

Tableau H - 3					
ref.	année	auteurs	solvant	nb de produits	travail
16	1962	DEWAR - GRISDALE	E-éthanol	33	M
12	1965	WELLS-ADCOCK	"	50	M
37	1961	CREAMER et coll.	E	7	M
48	1958	BERLINER-WINICOV	E-butcelloS	13	M
6	1961	BRYSON-MATTHEWS	E	2	M
108	1968	HOJO et coll.	E-éthanol	8	M
46	1954	PRICE-MERTZ	E-éthanol	5	M
164	1964	KOPTYUG-PETROV			C
47	1969	MAYER			C
38	1969	VIREY	E	14	M + C
61	1961	KORTUM	E-		C
165	1969	BONDEN-PARKIN	E-éthanol	5	M
M = mesures C = compilations					

Les paramètres calculés à partir de ces travaux sont regroupés dans le tableau H - 4 .

Tableau H - 4
constantes de réaction

acide	position du substituant	eq. DEWAR		eq. TAFT		equation de THIROT			
		ρ_{ij} (2)	π_{ij} (2)	ρ_I (3)	ρ_R (3)	ρ	r (2)	s (2)	d (2)
Benzoïque	-2	-	-	-	-	(1)	-	-	2,291
	-3	0,578	-0,009	1,	0,51	0,182	0,3	0	4,155
	-4	0,500	-0,102	1,46	1,77	0,196	1	0,2	4,500
Naphthoïque -1	-2	-	-	-	-	(3)	-	-	2,291
	-3	0,578	0,018	1,36	0,65	0,25	0,3	0	4,155
	-4	0,500	-0,139	1,58	2,38	0,35	0,9	0,35	4,500
	-5	0,378	-0,023	1,11	0,69	0,21	0,3	0,2	4,822
	-6	0,333	0,007	0,79	0,69	0,17	0,5	0,2	4,924
	-7	0,378	-0,033	0,64	0,75	0,14	1,1	0	3,775
	-8	-	-	-	-	-	-	-	1,800
Naphthoïque -2	-1	-	-	-	-	(3)	-	-	2,291
	-3	-	-	-	-	-	-	-	2,291
	-4	0,578	0,018	1,23	0,75	0,25	0,7	0	4,155
	-5	0,333	0,007	0,83	0,58	0,17	0,5	0	5,074
	-6	0,277	-0,033	0,83	0,88	0,18	0,8	0,1	6,062
	-7	0,289	0	0,79	0,58	0,17	0,5	0	5,063
	-8	0,378	-0,033	0,50	0,73	0,10	1,0	0,2	3,968
constantes de subst.		eq. DEWAR		eq. TAFT		equation de THIROT			
		F (1)	M (1)	σ_I	σ_R	σ_x^H	$\Delta\sigma_1$	$\Delta\sigma_2$	E_x
OH		0,12	-4,38	0,27	-0,44	0,85	1,5	3,3	0
NH ₂		-0,38	-4,75	0,10	-0,48	-0,35	1,4	4,55	0
NH ₃ ⁺		-	-	0,60 (4)	0 (4)	0	0	0	5,8
NMe ₃ ⁺		1,53	0,51	-	-	-	-	-	-

(1) valeurs calculées dans l'eau

(2) valeurs indépendantes du milieu

(3) déterminées en milieu mixte eau-éthanol 1/1 en volume.

(4) valeurs données par TAFT ()

La valeur de k dans l'équation de THIROT a été donnée dans les mélanges eau-éthanol 1/1

$$k_{\text{COOH}}^S = 0,88$$

Cet auteur propose d'écrire $k_{\text{COOH}}^S = t^S \cdot k_{\text{COOH}}^E$ avec $t^S = 1,5$

pour ramener les valeurs calculées à la solution aqueuse ,

Les résultats dont nous disposons nous font préférer une

valeur un peu différente : $t^S = 1,35$ (voir chapitre I) ,

3° Calcul des ${}^o\Delta_i pK$:

Le tableau H - 5 rassemble les valeurs de ${}^o\Delta_i pK$ calculées au moyen des relations 1 à 3, dans tous les milieux où les paramètres ont pu être obtenus.

On remarque que les résultats donnés par chacune de ces équations sont assez peu précis, et présentent quelquefois des écarts notables avec les valeurs mesurées. L'effet de solvant ne semble pas avoir -pour les dérivés étudiés- l'importance qu'on lui accorde d'habitude. Nos valeurs mesurées dans l'eau sont assez proches de celles qui sont calculées dans les milieux eau - éthanol à 50% en volume.

III - ACIDES DE TYPE BH^+ :

Les travaux traitant des effets de substituant, dans le cas des naphtylaminés, sont rares (Tableau H - 6) et seulement deux relations d'enthalpie libre sont suffisamment générales pour être utilisées ici (équations 1 et 3),

ref.	année	auteurs	solvant	nombre de produits	nature du travail
63	1963	BRYSON-MATTHEWS	eau	3	M
7	1960	BRYSON	"	45	M
69	1965	KOPTYUG	"		C
68		FISCHER	"	2	M
47	1969	MAYER	"	11	M
38	1969	VIREY	"	14	M
24-96	1950	BRYSON	"	13	M
109	1968	TAFT	"		-C
M = mesures			C = compilations		

Les données rassemblées à partir de ces travaux ont conduit au calcul des paramètres correspondant à ces deux équations, (Tableau H - 7).

Les travaux de TAFT ne permettent pas de calculer ${}^o\Delta_i pK_C$ car les constantes relatives au groupe $-COO^-$ sont peu précisées.

Les travaux de THIROT, de leur côté, ne donnent pas les valeurs du paramètre q dans l'équation 3, pour les diverses positions du naphthalène. Nous ne pouvons donc pas calculer ${}^o\Delta_i pK_B$ à l'aide de cette équation.

Le tableau H - 8 permet de comparer les valeurs de ${}^o\Delta_i pK$ calculées à celles qui ont été déterminées au cours de la présente étude.

Tableau H - 5

Acides benzoïques et naphtoïques

acide	position de substituant	$10^2 \times \Delta i$ pK_D $(-NH_2)$			$10^2 \times \Delta i$ pK_A $(-NH_3^+)$			$10^2 \times \Delta i$ pK_H $(-OH)$		
		trouvé dans H_2O	calculé		trouvé dans H_2O	calculé		trouvé dans H_2O	calculé	
			eq. 2 E	eq. 1 E/S		eq. 2 E (I)	eq. 3 E (2)		eq. 1 E/S	eq. 3 E/S
acides benzoïques	-2	-	-18	-9	183	99	165	130	19	11
	-3	-4	-68	-70	99	130	91	10	-39	-39
	-4	-73			63		83	-33		
acides naphtoïques	-2	-	-13	-17	109	88	165	49	14	10
	-3	-10	-86	-98	72	84	84		-55	-58
	-4	-11	-25	-22	79	59	78	-13	0	-5
	-5	-26	-10	-25	69	54	76	-15	-9	-10
	-6	-76	-28	-30	202	72	100	-27	-16	-11
	-7						208	12		-
	-8									
acides naphtoïques	-1	-66	-13	-24	258	88	165	102	0	-5
	-3	-32		-20	154		165	142	-3	-2
	-4	-8		-34	88		91		-17	-12
	-5			-20			74	-8	-4	-7
	-6			-35			62	-21	-23	-11
	-7			-18			74	-4	-4	-2
	-8			-26			95	-14	-19	-13

(1) avec NMe_3^+ au lieu de NH_3^+ , (2) avec $t^S = 1,35$

E = solvant : Eau

E/S = solvant : Eau-Ethanol 50% en volume

Tableau H - 6

acide		eq. de TAFT		eq. de THIROT $s=0$		
		ρ_I	ρ_R	ρ	ρ	d
anilinium	-3	2,89	0,88		0,3	4,155
	-4	3,85	4,47		1	4,500
naphtylamonium-1	-3	2,86	0,24	0,49	0,3	4,155
	-4			0,75	0,9	4,500
	-5	1,59	1,01	0,28	0,25	4,822
	-6	1,34	0,88	0,27	0,5	4,924
	-7	1,66	1,56	0,33	1,1	3,775
naphtylamonium-2	-4	2,30	1,30	0,43	0,7	4,155
	-5			0,27	0,55	5,074
	-6			0,37	0,8	6,062
	-7	1,36	1,00	0,27	0,5	5,063
	-8			0,36	0,8	3,968
substituants		eq. de TAFT		eq. de THIROT		
		σ_I	σ_R^o	σ_x^H	$\Delta_x \sigma_x$	E_x
COOH				1,8	0,33	0
COO-				1,	0	-2,8
COOR		0,31	0,15	1,85	0,32	0

Tableau H - 7

acides de référence		ion anilinium $pK = 4,60$		ion naphtylamonium-1 $pK = 3,98$		ion naphtylamonium-2 $pK = 4,17$	
$10^2 \cdot o\Delta ipK$		-COOH pK_B		-COO ⁻ pK_C			
		trouvé	calculé eq. 1	trouvé	calculé eq. 3		
anilinium	-3	92	103	-10			
	-4	218	186	82			
naphtylamonium-1	-3	83	93	-13	-1		
	-4	193		20	56		
	-5	57	64	-35	-23		
	-6		55		-30		
	-7		75		-33		
naphtylamonium-2	-4	92	90	-25	-7		
	-5	72		-23	-20		
	-6				9		
	-7		57		-20		
	-8				-23		

IV - CONCLUSION :

Les valeurs de Δ i pK calculées pour les acides de type AH et BH⁺ nous permettent de déterminer théoriquement les constantes vraies d'équilibre acide-base du système de tautomérisation donné en introduction .

Tableau H - 8

acide	amino	pK _A calculé	pK _B calculé	pK _C calculé	pK _D calculé
benzoïque	-3	3,29	3,57		
	-4	3,37	2,74		
naphtoïque-1	-3	2,91	3,27	4,24	3,89
	-4	2,88		3,42	4,70
	-5	2,94	3,34	4,21	3,94
	-6	2,96		4,37	3,97
	-7	2,72		4,40	4,02
naphtoïque-2	-4	3,25	3,05	3,99	4,40
	-5	3,42	3,43	4,28	4,36
	-6	3,54		4,08	4,50
	-7	3,42	3,60	4,37	4,36
	-8	3	3,23	4,31	4,46

Dans ces conditions , les relations linéaires d'enthalpie libre peuvent être utilisées pour estimer l'importance de l'équilibre de tautomérisation d'amino acides en solution aqueuse . Le tableau H - 9 établit la comparaison entre valeurs calculées et valeurs observées .

Tableau H - 9

% de zwitterions dans l'acide		les solutions aqueuses	
		+ calculé	+ mesuré
benzoïque amino-	-2	*	
	-3	66	70
	-4	19	4
naphtoïque-1 amino	-2	*	
	-3	70	83
	-4	5	6
	-5	70	76
	-6	72	73
	-7	72	
	-8	*	98
naphtoïque-2 amino	-1	*	22
	-3	*	62
	-4	33	44
	-5	48	
	-6	28	
	-7	56	
	-8	47	

* les relations d'enthalpie libre ne permettent pas de faire un calcul complet pour les positions ortho ou péri .

On remarque que , lorsque la mesure du taux de zwitterions a été faite , l'écart entre valeur calculée et valeur observée est toujours inférieur à 15 % . Il paraît donc possible d'étendre la validité des valeurs de α obtenues par le calcul à toutes les positions du cycle naphthalénique (sauf aux positions ortho ou péri) .

L'estimation de α et celle des valeurs des constantes de dissociation vraies , permettent de préciser les zones où devront être effectuées les mesures , lors de la détermination expérimentale des constantes relatives aux acides amino naphthoïques qui n'ont pas encore été obtenues .

La combinaison de deux relations d'enthalpie libre est rendue obligatoire si l'on veut calculer toutes les constantes (K_A à K_D) car :

- d'une part , l'équation de TAFT ne permet pas d'estimer facilement l'effet des groupes chargés;
- d'autre part , tous les paramètres de l'équation de THIROT ne sont pas précisés .

On peut , cependant , remarquer le bon accord entre les résultats obtenus par application de l'une ou l'autre équation , au calcul des pK d'acides benzoïques ou naphthoïques substitués par les groupes $-NH_2$ ou $-OH$. Cet accord , relatif seulement à deux équilibres acide-base , ne nous permet pas , toutefois , de dire laquelle des deux équations 1 ou 3 est la plus favorable

- au calcul général des grandeurs Δ_i pK .
- à la description de la transmission des effets électroniques dans des systèmes transmetteurs variés .

Cependant ces relations ont pu être utilisées avec succès pour obtenir , par le calcul , le taux de zwitterions dans les solutions aqueuses à 20°C des acides amino-benzoïques et amino-naphthoïques .

CH A P I T R E I	page
ETUDE DE LA SOLVATATION	126
I- RELATIONS ENTRE STRUCTURE ET REACTIVITE	126
II- EFFETS DE SOLVANT SUR LES ACIDES ETUDIES	128
1°) Acides carboxyliques	128
a) dérivés substitués en méta et para	128
b) dérivés ortho et péri	128
2°) Ions amoniiums	128
III- DISCUSSION	131
1°) Cas des solvants purs	131
2°) Cas des solvants mixtes	132
IV.- CONCLUSIONS	134

CHAPITRE I : ETUDE DE LA SOLVATATION

1- RELATIONS ENTRE STRUCTURE ET REACTIVITE :

L'introduction de relations entre structure et réactivité est liée à la définition d'un certain nombre d'éléments standards que nous avons tenté de préciser en milieu aqueux (200). De la même façon qu'on a caractérisé l'influence d'un substituant sur l'équilibre acide-base par la grandeur ${}^o\Delta_i pK$, on peut mesurer l'effet de solvant sur la variation de pK par le calcul de la grandeur :

$${}^s\Delta^E pK = p^S_{K_i} - p^E_{K_i} \quad \text{eq. (1)}$$

où l'indice E caractérise les mesures faites dans l'eau, et l'indice S celles faites dans un solvant pur ou mixte S.

Les valeurs de pK déterminées dans un milieu pur ou mixte donné, peuvent être comparées entre elles, car elles sont établies dans une échelle d'acidité dont l'origine correspond à $(S^+) \equiv 1$ dans le milieu envisagé. Par contre, la comparaison directe des valeurs obtenues pour un même acide dans deux milieux différents ne fournit que la variation du ΔG° de la réaction entre particules nues. Or l'équilibre effectivement réalisé en solution fait intervenir le solvant, et les ΔG° mesurés sont des grandeurs complexes.

Les relations d'enthalpie libre, présentées sous la forme proposée par HAMMETT (170), permettent d'éviter la difficulté de résolution de ce problème. Tant que les deux acides considérés appartiennent à la même famille de solvation, l'équilibre acide-base global est réalisé sans intervention de molécules de solvant.

L'utilisation d'une relation d'enthalpie libre de type HAMMETT, dans tout solvant, donne :

$$p^S_{K_i} = p^S_{K_0} - {}^S\rho {}^S\sigma_i$$

$$p^E_{K_i} = p^E_{K_0} - {}^E\rho {}^E\sigma_i$$

Si la constante de substituant σ est indépendante du milieu, c'est à dire si on peut porter toute l'influence de la solvation sur la seule constante de réaction ρ , ce système permet d'écrire :

$$p^S_{K_i} = {}^S_A + {}^S_B \times p^E_{K_i} \quad \text{eq. (2)}$$

ou encore :

$$\frac{{}^o\Delta_i p^S_{K_i}}{{}^o\Delta_i p^E_{K_i}} = \frac{{}^S\rho}{{}^E\rho} = {}^S_B \quad \text{eq. (3)}$$

10 ² S Δ ^E pK acides carboxyliques % MeOH en masse										
acidité	acide	pos. ion	10	20	30	40	50	60	70	80
-NH ₂ pK _D	B	-2	18	39	55	91	119	145	178	223
		-3	20	42	66	94	121	148	178	226
		-4	18	42	67	94	121	150	187	241
	N-1	-3	15	40	64	90	117	145	173	224
		-4	22	49	77	105	134	163	194	237
		-5	20	41	70	99	129	159	189	232
		-6	17	42	69	97	126	155	184	224
		-8	27	58	89	118	148	178	209	255
	N-2	-1	20	42	67	93	124	157	188	230
		-3	16	40	65	89	114	139	166	207
		-4	16	43	71	98	126	154	185	233
-OH pK _H	B	-2	11	27	46	67	89	112	137	173
		-3	20	44	70	97	124	151	180	230
		-4	18	40	64	92	118	147	191	255
	N-1	-5	18	39	68	97	127	157	187	230
		-6	16	38	67	95	124	142	180	223
		-7	18	43	72	100	128	156	186	237
		-8	9	20	34	50	69	88	110	140
	N-2	-1	11	26	43	62	81	101	131	172
		-3	10	21	48	66	88	109	133	179
		-5	20	46	75	103	132	160	191	238
		-6	18	43	71	99	126	165	183	227
		-7	20	44	72	102	132	155	190	240
		-8	20	44	71	100	130	155	190	243
-NH ₃ ⁺ pK _A	B	-3	18	35	55	77	104			
		-4	17	36	58	80	100			
	N-1	-3	11	26	47	71	99			
		-4	19	44	72	105				
	N-2	-4	10	25	45	68				

Tableau 1 - 2

$-10^2 \Delta E$		pK_B	ions amoniux							
% MeOH		base	10	20	30	40	50	60	70	80
-COOH	B	-2	9	23	.					
		-3	5	12	21	32	42	52	55	50
		-4	4	12	21	33	44	57	61	52
pK_B	N-1	-3	3	8	16	26	39	49	49	43
		-4	6	16	27	41	55	67	69	61
		-5	5	13	22	36	54	67	68	56
		-6	4	10	17	23	32	41	48	44
		-8	4	12	22	34	45	55	56	36
	N-2	-4	6	14	24	38	55	68	72	64

B = dérivés de l'acide benzoïque ou de l'ion anilinium
N-1 = dérivés de l'acide naphtoïque-1 ou de l'ion naphtylamonium-1

II - EFFETS DE SOLVANT SUR LES ACIDES ETUDIÉS :

La compilation des valeurs de $S\Delta^E pK$ définies par l'équation I-1 relatives aux acides amino- et hydroxy- benzoïques et naphtoïques étudiés au cours de ce travail, dans les tableaux I - 1 et I - 2 permet de faire plusieurs remarques :

1° Acides carboxyliques :

a) dérivés substitués en méta et para :

Dans le cas des dérivés substitués en méta et para par les groupes $-NH_2$ et $-OH$, le terme $S\Delta^E pK$ prend la même valeur pour tous ces composés, dans un milieu déterminé. L'écart type pour 16 produits et 9 milieux est inférieur à 0,05 unité pK. La valeur moyenne de $S\Delta^E pK$ est identique à celle que l'on obtient pour les acides naphtoïques, ainsi que pour les acides benzoïque et para toluïque dont les constantes ont été déterminées par JUILLARD (112).

Le parallélisme de comportement entre ces produits est tout à fait remarquable.

b) dérivés ortho et péri :

L'influence du solvant sur la dissociation des dérivés ortho et péri hydroxylés est moins importante que pour les précédents, ce qui peut être interprété en remarquant que la chélation (108,171, 172) - dont la nature a été précisée par MORI (173) - implique un moindre changement de structure du complexe de solvation lors de l'ionisation (161 a...).



Si on compare l'effet de solvant sur les dérivés hydroxylés en ortho et péri, et celui sur les mêmes acides substitués dans des positions différentes, on observe un accroissement de l'écart entre ces familles lorsque la teneur en méthanol dans le solvant augmente.



Figure n° 46


Cela signifie, à notre avis, que l'addition de méthanol favorise la formation de liaisons hydrogène intramoléculaires. TERRIER (114) était arrivé à une conclusion semblable. Les résultats de THUAIRE (117,174) suggèrent également l'influence croissante des liaisons de ce type, dans l'ionisation des acides benzoïques ortho substitués, en milieu eau - éthanol.

2° Ions amoniiums :

Lorsque le substituant est $-COOH$, on observe encore un assez bon parallélisme de comportement dans les milieux eau - méthanol, à condition de distinguer trois familles de composés :

- aniliums
- naphtylamoniums-1
- naphtylamoniums-2





— Corrélation entre les valeurs de pK et les valeurs de pK_s mesurées dans les milieux comportant 8,2 25,0, 43,2 et 63,6 % de méthanol en masse (droites I à IV).

Les produits numérotés de 1 à 14 sont ceux du tableau et les numéros suivants correspondent aux acides : benzoïque (15), α et β -naphtoïques (16-17), *o*-, *m*-, *p*- amino-benzoïques (18 à 20), amino-4, -5, -6 naphtoïque-1 (21 à 23), amino-3 et -4 naphtoïques-2 (24-25).

n°

Acides.

benzoïques :


- | | | |
|---|-------|-----|
| 1 | ortho | —OH |
| 2 | méta | —OH |
| 3 | para | —OH |

naphtoïques-1 :

- | | | |
|---|---|-----|
| 4 | 2 | —OH |
| 5 | 5 | —OH |
| 6 | 6 | —OH |
| 7 | 7 | —OH |
| 8 | 8 | —OH |

naphtoïques-2 :

- | | | |
|----|---|-----|
| 9 | 1 | —OH |
| 10 | 3 | —OH |
| 11 | 6 | —OH |
| 12 | 7 | —OH |
| 13 | 8 | —OH |
| 14 | 5 | —OH |



Là encore , la position du substituant sur la molécule importe peu , à condition d'examiner séparément les dérivés substitués en ortho .

Figure n° 47

La distinction de trois familles nous amène à penser que l'analogie entre valeurs de $\Delta^E pK$ obtenue pour les acides α et β naphthoïques , est fortuite . On peut faire un rapprochement entre l'influence peu marquée du groupement $-COOH$ sur le cycle aromatique par rapport à celle du groupe $-NH_2$, et la faiblesse des constantes de substituant relatives aux groupes carboxyliques (11,15,166,167) . Ces valeurs faibles ne permettraient pas de distinguer les trois classes avec assez de précision dans le cas des acides carboxyliques , alors que l'examen du comportement des amoniums les révèle sans ambiguïté .

c) Corrélations entre valeurs de pK :

La figure n° 48 montre qu'en représentant p^S_K en fonction de p^K dans les mélanges eau-méthanol utilisés , pour les acides carboxyliques étudiés , on obtient des droites de pente-unité , avec un taux de corrélation excellent .

On observe une aussi bonne corrélation pour les ions amoniums substitués par le groupe $-COOH$. Figure n° 49

Les distinctions entre séries sont très apparentes , et nos acides carboxyliques donnent trois groupes :

- dérivés de type méta et para substitués par $-OH$ ou $-NH_2$, et dérivés substitués en ortho par $-NH_2$,
- dérivés ortho hydroxylés ,
- dérivés péri

Nous avons interprété l'appartenance des dérivés ortho aminés au premier groupe , comme une indication de la faible influence des liaisons hydrogène intramoléculaires dans ces composés.

Au contraire , les dérivés ortho hydroxylés , en raison de l'importance de la chélation avec le groupement $-COOH$ voisin de l'hydroxyle , doivent être classés dans une famille particulière.

Les amines étudiées amènent à considérer des familles plus restreintes . Il semble que la plus grande sélectivité des effets de solvant sur l'ionisation des amines aromatiques , rende compte de l'influence des atomes voisins du groupe $-NH_2$, lors de la solvation .

III - DISCUSSION :

1° Cas des solvants purs :

Un nombre important de constantes d'équilibre acide-base a été publié pour des solvants purs très variés (11,15,77,103,166,167,175,176) . Bien que la variation d'acidité qui accompagne le passage d'un solvant à un autre soit liée à la nature de l'acide considéré , on constate que la différence $\Delta^E pK$ garde une valeur pratiquement constante pour des molécules de structures



assez voisines (112,114,115) dans le cas des phénols ($\text{OH} \rightleftharpoons \text{O}^-$) et ($\text{NH} \rightleftharpoons \text{N}^-$).

Figures 50 et 52

Au contraire, dans le cas des acides carboxyliques, le rapport S_p / E_p de l'équation 3 semble dépendre fortement du solvant (111, 113, 116, 117).

Figures 51 et 53

THIROT (180) propose des valeurs moyennes de ce rapport, supposées d'application générale; mais si on examine l'influence du solvant sur des acides de même type, on obtient des résultats assez contradictoires (Tableau 1 - 3).

acides	Tableau 1 - 3	S_p / E_p	solvant	ref.
acides benzoïques		1,35	méthanol	113
acides carboxyliques aliphatiques		0,81	méthanol	11
		1,77	isopropanol	180
		2,12	acétone	"
		1,99	chlorobenzène	"
		2,03	benzène	"
		1,61	isopropanol	"
		2,22	acétone	"
		2,01	chlorobenzène	"
		2,32	benzène	"


- Le rapport S_p / E_p dépend fortement de la nature des acides carboxyliques étudiés,
- Dans le cas des phénols disubstitués en ortho, ce rapport semble peu affecté par la nature des substituants dans certains solvants (chlorobenzène) alors qu'il y est assez sensible dans d'autres (benzène).





Il est donc difficile de conclure à un effet constant, calculable à priori, du solvant.

De plus, il est très rare que les valeurs de pK proposées correspondent à une gamme de composés suffisamment étendue, dans une même série réactionnelle, pour un domaine d'acidité assez vaste. Les incertitudes expérimentales peuvent ainsi devenir telles que la détermination thématique de la pente de la droite $p^{SK} = f(pEK)$ fournissant le rapport des constantes de réaction dans l'un et l'autre milieu, n'a pas de véritable signification physique.

2° Cas des solvants mixtes :

Dans le cas des solvants mixtes (eau - solvant S), et en admettant qu'il n'existe pour chaque espèce que deux solvates :






il coexiste dans la solution au moins huit espèces de composés, et l'équilibre que nous considérons s'écrit :



Si on veut ne pas tenir compte du solvant (E ou S) dans cet équilibre ,il faut que la combinaison des deux dissociations fasse disparaître dans l'écriture globale , les molécules de E et S qui participent à chacun des équilibres élémentaires ,

Lorsqu'on observe un parallélisme de comportement entre plusieurs composés , cela doit être attribué à l'existence unique ou prépondérante d'un solvate de composition déterminées , Un tel solvate n'existe , en général , que sur une gamme limitée de milieux mixtes de composition variable (80) ,

D'autre part , il est possible de vérifier la loi de HAMMETT dans de très nombreux milieux mixtes , mais on a souvent remarqué que les valeurs de ρ déterminées dans l'eau , ne sont utilisables en milieu mixte que lorsque la solvatation n'affecte pas directement le substituant , De plus les valeurs proposées pour le rapport $\frac{\rho_\text{S}}{\rho_\text{E}}$ varient notablement selon les auteurs , La figure ci-dessous en donne un exemple .



IV - CONCLUSIONS :

La figure n° 51 relative aux ionisations d'acides carboxyliques dans des solvants purs , et la figure n° 54 correspondant aux mêmes acides en milieux mixtes , montrent :


- qu'on peut établir une relation de type HAMMETT en utilisant tous les substituants (droite n°1) Dans le cas des acides benzoïques , $\rho_\text{B} = 1,35$ si le solvant S est le méthanol pur .
- que , si au contraire , on examine les résultats d'un autre point de vue , pour des substituants identiques (ou très voisins : comme les halogènes qui sont souvent rejetés des corrélations de HAMMETT) , la corrélation est bien meilleure avec $\rho_\text{B} = 1$. Mais il faut alors admettre que

le terme sA peut varier (droites 2,3,4,5) .

Cela amène à définir plusieurs classes de substituants .

Nous conviendront de dire que les groupes admettant la même valeur de sA , correspondant à $^sB = I$, appartiennent à la même famille de solvation .

Cela revient à considérer la relation (2) d'un double point de vue :



Les figures n° 51 et 53 pour les solvants purs , et 54 pour les milieux mixtes , illustrent ces deux aspects , dans le cas des acides carboxyliques .


Les ionisations des nitrophénols (Figure n° 50) ou des nitroamines aromatiques (Figure n° 52) correspondent chacune à une seule famille de solvation , au sens ainsi défini .

Les figures n° 51 , 53 , 54 révèlent que , lorsque les liaisons hydrogène entre le substituant et le groupe $-COOH$ sont faibles , (il faut donc éliminer $-F$ ou $-OH$ de la comparaison) , les points représentatifs des dérivés substitués en position ortho se répartissent sur une droite de pente unité ($^sB = I$). Ceci permet d'attribuer la même classe de solvation à tous les groupes considérés lorsqu'ils sont en ortho du centre réactif , aussi bien pour les couples de solvants purs eau-méthanol et eau-éthanol , que pour les couples mixtes eau-mélanges hydrométhanoliques ou éthanoliques .

L'utilisation d'une relation linéaire d'enthalpie libre dans un solvant pur ou mixte , revient à admettre que tous les produits introduits dans la comparaison appartiennent à la même série de solvation , car l'écriture de la relation de HAMMETT pour tout milieu , implique l'examen de l'équilibre acide-base global sans faire intervenir le solvant .

Lorsque l'expérience montre que la loi de linéarité rend bien compte des modifications de réactivité , pour un nombre suffisant de dérivés , cela signifie :

Milieu mixte contenant
52,0% d'éthanol en masse
 $\vartheta = 25^{\circ}\text{C}$



- soit que les produits étudiés sont solvatés de façon identique par les molécules du milieu environnant ,
- soit qu'il y a compensation entre les variations de solvation des molécules et des ions , quel que soit le substituant considéré ,
- soit que les variations d'enthalpie libre attribuables à l'apparition ou à la disparition de molécules de solvant "libre" sont négligeables devant les variations d'enthalpie libre des produits dissous .

Dans le cas où la linéarité n'est pas respectée parfaitement , cela peut provenir de l'influence du solvant ; en effet , si on considère que la variation de la constante de réaction classique avec le milieu , peut être attribuée à des modifications intervenant au sein de la sphère de solvation des particules , on est amené à distinguer deux types de solvations limites :

a) Solvation spécifique : $^S\psi_s$

L'affinité du solvant pour certains groupes peut entraîner la fixation quasi sélective de molécules organiques . C'est le cas des amines (78) .

Dans ce cas , l'effet de solvant porte essentiellement sur σ et non sur ρ . Ainsi , pour les acides carboxyliques ortho substitués , ρ varie assez peu ($^S\rho \cong 1,00$) quand on passe de l'eau à l'alcool pur .

Cela signifie également que le remplacement de l'eau par l'éthanol -ou par le méthanol- a une influence faible sur la transmission des effets de substituants lorsque les groupes concernés sont assez proches l'un de l'autre . ERHENSON (179) était parvenu à une conclusion de ce type .

b) Solvation non spécifique : $^S\psi_{ns}$

Les charges formelles ou réelles , portées par les particules étudiées , induisent la polarisation des molécules du solvant , et amènent à les inclure dans la coquille globale de solvation .

Si l'on suppose que , dans ce cas , l'effet de solvant sur la valeur de $\sigma \Delta_i pK$ peut être mis en facteur , on obtient une expression simplifiée semblable à celle proposée par THIROT ; mais une telle hypothèse oblige à considérer que la transmission de tous les effets électroniques est affectée de la même façon par le changement de solvant :

- conduction par les liaisons σ
- déplacement des orbitales π
- transmission par l'espace

Or les valeurs de $^S\Delta^E pK$ sont , en général , légèrement plus faibles pour les dérivés para que pour

les dérivés méta (figure n° 54 droites m et p) .
La solvation paraît être défavorisée par la moins grande délocalisation électronique .
De plus , la transmission des effets de substituants chargés ($-NH_3^+$ et $-COO^-$ dans notre cas) ou $-COO^-$ et $-SO_3^-$ (118) ne peut être prévue simplement pour tous les milieux mixtes .

Par conséquent , il apparaît que "l'effet de solvant " ne peut "être mis en facteur" dans l'équation de corrélation entre structure et réactivité .

C'est pourquoi nous proposons d'utiliser les relations d'enthalpie libre avec quelques précautions lors du changement de solvant , en employant une équation de type 4 :

$${}_0\Delta_{ip}^{SK} = E + {}^S\Psi_S + {}^S\Psi_{NS} \quad \text{eq. (4)}$$

où E représente les effets électroniques de substituant , définis par des produits de type $\rho\sigma$.

La fonction ${}^S\Psi_S$ dépend du solvant et des substituants seuls .

La fonction ${}^S\Psi_{NS}$ dépend du solvant , des groupes fixés sur le squelette , du système T .

Les fonctions ${}^S\Psi$ étant normées en milieu aqueux , de telle façon que ${}^E\Psi = 0$ dans le cas des acides benzoïques substitués ; elles décriront les variations de solvation (spécifique ou non) lors du passage d'une solution aqueuse à un autre solvant .

Dans le cas général , pour une famille de substituants au sens large , deux termes de solvation peuvent intervenir dans l'équation 4 . L'effet de solvant peut alors être difficilement estimé lors de l'application des relations complexes aux systèmes non benzéniques .

Par contre , lors de l'examen d'une famille de solvation spécifique homogène - comme c'est le cas pour nos acides aminonaphtoïques et hydroxy naphtoïques substitués dans diverses positions - on a :

$${}^S\Psi_S = {}^SC = \text{constante ne dépendant que de } S$$

Si ${}^S\Psi_{NS}$ est peu affecté par le changement de position du substituant sur la molécule (les distances entre X et Y sont peu différentes pour de nombreuses positions de substitution du cycle naphthalénique) on a :

$${}^S\Psi_{NS} \cong \text{Constante}$$

Pour deux substituants identiques , l'un en position i et l'autre en position j , on peut écrire :

$$\begin{cases} p^{EK_i} = E_i + {}^EC \\ p^{SK_i} = E_i + {}^SC \end{cases} \quad \begin{cases} p^{EK_j} = E_j + {}^EC \\ p^{SK_j} = E_j + {}^SC \end{cases}$$

La comparaison de ces deux égalités donne :

$$p^{SK_i} = p^{EK_i} + {}^S\Delta^EC \quad \text{ou encore} \quad {}^S\Delta^E pK_i = {}^S\Delta^E pK_j$$

ce qui correspond bien aux résultats obtenus , et justifie l'emploi des relations linéaires d'enthalpie libre , suivant les deux méthodes proposées .

CONCLUSION



Le problème que nous nous étions posé en abordant cette étude :

Détermination des structures d'acides aminés aromatiques , à l'état solide , en solution aqueuse et en solution hydro-alcoolique ,

a été examiné sous deux aspects :

1°) analyse qualitative de l'état solide par spectrophotométrie infra-rouge :

- Nous avons montré - à cette occasion - que les acides aminés , qui sont zwitterioniques dans ces conditions , possèdent des caractéristiques spectroscopiques permettant de les identifier sans ambiguïté .*
- Nous présentons une table de corrélation permettant le dépouillement rapide et systématique des spectres d'acides isomères .*
- Nous avons , enfin , proposé l'amorce d'une nouvelle méthode d'analyse des structures et des substitutions , en système benzénique ou naphthalénique par considération quantitative de l'influence des substituants sur la fréquence de certains vibreurs ν (I C-H) .*

2°) analyse quantitative de l'équilibre de tautomérisation entre molécules et zwitterions , dans l'eau et les milieux hydro-méthanoliques .

. Pour cela , il fallait mettre en oeuvre des techniques expérimentales , ou des méthodes de calcul , qui ont été présentées dans le but de rassembler les divers procédés utilisables

- utilisation pratique des solvants mixtes eau - méthanol ,
- spectrophotométrie en ultra-violet à basse température (-120°C) en solution hydro-alcoolique ,
- calcul des constantes apparentes de dissociation de diacides à acidités voisines ,
- application des relations d'enthalpie libre (LFER) au calcul des constantes de dissociation .

Cela nous a permis de déterminer les deux constantes apparentes de dissociation des acides amino -2 , -3 , -4 benzoïques , amino -3 , -4 , -5 , -6 , -8 naphtoïques-I et amino -I , -3 , -4 naphtoïques-2 , dans l'eau et neuf milieux mixtes eau-méthanol .

. L'équilibre de tautométrie entre molécule (M) et zwitterion (Z) implique l'existence simultanée , dans la solution , des espèces M et Z . Ce mélange (M + Z) , que nous avons désigné par (X) , présente à l'égard des réactions acide-base , les mêmes caractéristiques qu'un corps pur .

- De tels systèmes n'avaient pu , jusqu'à présent, être résolus que dans certains cas particuliers, au moyen d'une hypothèse extra thermodynamique qui permet d'estimer l'une des constantes vraies de dissociation . Nous avons utilisé cette méthode (B) , et nous en avons proposé deux nouvelles (C) et (D) de ce type .
- Nous avons , d'autre part , développé une technique différente , et montré que l'usage d'une série de solvants mixtes permet de déplacer l'équilibre de tautométrie , et de doser le mélange X , ce qui nous a permis de résoudre le problème sans faire aucune approximation .

Dans tous les cas , les résultats se sont trouvés être parfaitement concordants dans tous les milieux étudiés , et

nous avons précisé les limites de validité de ces méthodes
Nous avons pu en déduire les quatre constantes vraies de dissociation des amino acides étudiés , dans les divers solvants utilisés . L'équilibre de tautomérisation a été précisé dans tous ces milieux .



Dans le but d'étendre notre compréhension du mécanisme de tautomérisation , nous avons tenté de déplacer l'équilibre entre molécules et zwitterions , en suivant les transformations du mélange X "en continu" par :

- utilisation de solvants mixtes de teneur croissante en méthanol , à température ambiante ;
- enregistrement des spectres ultra-violet d'amino acides en solution hydro-méthanolique , sur une gamme de température très étendue (de $+60^{\circ}$ à -110°C) .

Cela nous a permis , dans certains cas :

- de calculer le spectre de la forme Z , à température ordinaire lorsque cette espèce n'existe pas seule , dans ces conditions ,
- de vérifier, expérimentalement , la concordance entre ce spectre calculé et celui du même produit , en milieu mixte , à très basse température ,
- de préciser les grandeurs thermodynamiques fondamentales (ΔH et ΔS) liées à l'équilibre de tautomérisation de deux acides (acides amino -5 et -8 naphthoïques-I) dans les mélanges d'eau et de méthanol .



Les résultats expérimentaux accumulés nous ont permis d'examiner deux aspects de l'utilisation des relations linéaires d'enthalpie libre

- prévision des constantes de dissociation ,
- emploi de solvants variés .

Nous avons montré que , de façon très satisfaisante , les valeurs du taux de zwitterions calculées correspondent aux déterminations

expérimentales .

Il nous a fallu , à ce sujet , émettre quelques réserves sur l'utilisation des valeurs de pK obtenues dans un milieu , pour calculer les pK des mêmes produits dans un autre solvant . Cela nous a amené à considérer plus généralement les solvants , purs ou mixtes eau-alcool , et nous avons proposé une utilisation différente des LFER pour tenir compte des "effets de solvant" de façon moins systématique .

BIBLIOGRAPHIE

abréviations utilisées :

AJC	= Aust. J. Chem.	JCS	= J. chem. Soc.
ANN	= Ann. chim. phys.	JOC	= J. org. chem.
BER	= Chem. Ber.	JPC	= J. phys. chem.
BSCF	= Bull. Soc. chim.	NBS	= J. Res. nation. Bur. Stand.
CA	= Chemical Abstracts	SPA	= Spectrochem. Acta
CJC	= Canadian J. Chem.	TFS	= Trans. Faraday Soc.
CRAS	= C. R. Acad. Sci.	ZE	= Z. Elektrochem.
JACS	= J. amer. chem. Soc.	ZPC	= Z. f. phys. chem.
JBC	= J. biol. chem.	HCA	= Helv. chim. Acta
JCP	= J. chim. phys.		

-
- 1 - E.Q. ADAMS , JACS , 38 , 1503 ,(1916)
 - 2 - N. BJERRUM , ZPC , 104 , 147 ,(1923) et 106 , 219 ,(1923)
 - 3 - E.J. COHN - J.T. EDSALL , Proteins, amino acids, peptides , Reinhold
New York (1943)
 - 4 - R.A ROBINSON - A.I. BIGGS , AJC , 10 , 128 ,(1957)
 - 5 - R.A ROBINSON - R.H. STOKES , Electrolyte Solutions , Butterworths
London (1959)
 - 6 - A. BRYSON - R.W. MATTHEWS , AJC , 14 , 237 ,(1961)
 - 7 - A. BRYSON , JACS , 82 , 4852 et 4862 ,(1960)
 - 8 - J. C. HALLE - F. TERRIER - R. SCHALL , CRAS , 270 C , 1684 ,(1970)
 - 9 - R. GABORIAUD , CRAS , 270C , 1925 ,(1970)
 - 10 - W.D. KUMLER , JOC , 20 , 700 ,(1955)
 - 11 - G. THIROT , BSCF , n°9 , 3559 ,(1967)
 - 12 - P.R. WELLS - W. ADCOCK , AJC , 18 , 1365 ,(1965)
 - 13 - J. CLARK - D.D. PERRIN , Quart. Rev., 18 n° 3 , 295 ,(1964)
 - 14 - H.D. Mc DANIELL - H.C. BROWN , JOC , 23 , 120 ,(1958)
 - 15 - G. THIROT , BSCF , n° 5 , 1989 ,(1968)
 - 16 - M.J.S. DEWAR - P.J. GRIDALE , JACS , 84 , 3539 à 3553 ,(1962)
 - 17 - F.M. BERINGER - S. SANDS , JACS ? 75 , 3319 ,(1953)
 - 18 - G.M. BRAUER - G. DURANY - H. ARGENTAR , NBS , 71 A , 379 ,(1967)
 - 19 - HEDESTRAND , ZPC , 135 , 36 ,(1928)
 - 20 - G. DEVOTO , Gazz. chim. Ital ., 63 , 247 ,(1933) et 64 , 371 ,(1934)

- 21 - H. HUNT - H.T. BRISCOE , JPC , 33 , 1495 ,(1929)
- 22 - M. EIGEN - E.M. EYRING , JACS , 84 , 3254 ,(1962)
- 23 - J.T. EDSALL - M.H. BLANCHARD , JACS , 55 , 2337 ,(1933)
- 24 - O. DE CORNINCK , ANN , 4 , 528 ,(1895)
- 25 - H.H. WEBER , Biochem. Z., 218 , 1 ,(1930)
- 26 - WEBER - NACHMANN SOHN , Biochem.Z., 204 , 215 ,(1929)
- 27 - E.J. COHN - T.L. Mc MEEKIN - J.T. EDSALL - M.H. BLANCHARD , JACS ,
56 , 784 ,(1934)
- 28 - J. TRAUBE , Liebigs Ann., 290 , 43 ,(1896)
- 29 - J.J. CHRISTENSEN - D.P. WRATHALL - R.M. IZATT - D.O. TOLMAN , JPC ,
71 , 3001 ,(1967)
- 30 - SCHULER - A. WOELDIKE , Z. naturforsch., 2a , 657 ,(1947)
- 31 - L. GOPAL - C.I. JOSE - A.B. BISWAS , SPA , 23 A , 513 ,(1967)
- 32 - A. GROULT , mémoire CNAM , Rouen (1968) , non publié
- 33 - I. MENTRE , rapport INSCI Rouen (1967) , non publié
- 34 - R. KUHN - W. OTTING - K. GEIDER , BER , 101 , 3597 ,(1968)
- 35 - P. LEGGATE - G.E. DUNN , CJC , 43 , 1158 ,(1965)
- 36 - R. KUHN - K. GEIDER , BER , 101 , 3587 ,(1968)
- 37 - L.K. CREAMER - A. FISCHER - B.R. MANN - J. PACKER - R.B. RICHARDS
J. VAUGHAN , JOC , 26 , 3148 ,(1961)
- 38 - J. VIREY , Thèse Docteur-Ingénieur , Rouen , juillet 1969
- 39 - J.C. PAYAN , INSCI Rouen , communication personnelle
- 40 - E.P. SERJEANT , AJC , 22 , 1189 ,(1969)
- 41 - W.L. BRIGHT - H.T. BRISCOE , JPC , 787 ,(1932)
- 42 - I.M. KLOTZ - D.M. GRUEN , JACS , 67 , 843 ,(1945)
- 43 - H. SCHMID - H. SOFER - H. PLESCHBERGER , Monat. Chem., 98 , 353 ,(1966)
- 44 - E. UHLIG - K. DOERING , BER , 97 , 1127 ,(1964)
- 45 - H. HUNECKE , BER , 60 , 1451 ,(1927)
- 46 - E. UHLIG , BER , 93 , 2470 ,(1960)
- 47 - J. MAYER , Thèse Docteur-Ingénieur , Rouen , décembre 1969
- 48 - KUSTER , Z. anorg. chem., 13 , 135 ,(1897)
- 49 - BREDIG , ZE , 6 , 33 ,(1899)
- 50 - L. EBERT , ZPC , 121 , 385 ,(1926)
- 51 - J.M. VANDENBELT - C. HENRICH - S.G. VANDENBERG , Anal. chem., 25 , 726
(1954)
- 52 - I. HAUSSER , Sitzungber.d.Heidelberger Akad.d.Wiss, n°6 (1935)
- 53 - J.T. EDSALL - J. WYMAN , JACS , 57 , 1964 ,(1935)
- 54 - J. WYMAN , Chem. Rev., 19 , 218 ,(1936)
- 55 - E.R.B. SMITH - P.K. SMITH , JBC , 117 , 209 ,(1937) ... 132 , 47 ,(1940)
135 , 273 ,(1940)
- 56 - P.K. SMITH - E.R.B. SMITH , JBC , 121 , 607 ,(1937) et 132 , 57 ,(1940)

- 57 - P.K. SMITH - A.C. TAYLOR - E.R.B. SMITH , JBC , 122 , 109 ,(1937)
- 58 - M.M. RICHARDS , JBC , 122 , 727 ,(1938)
- 59 - G. SCATCHARD - S.S. PRENTISS , JACS , 56 ,2314 ,(1934)
- 60 - N.F. HALL - M.R. SPRINKLE , JACS , 54 , 3469 ,(1932)
- 61 - G. KORTUM - W. VOGEL - K. ANDRUSSOV , Dissociation constants of organic acids in aqueous solutions , Butterworths ,(1961)
- 62 - J. JOHNSON , ZPC , 57 , 557 ,(1907)
- 63 - R. WEGSCHEIDER , Monat. chem., 16 , 153 ,(1895) et 23 , 287 ,(1902)
- 64 - KUHN - WASSERMANN , HCA , 11 , 3 ,(1928)
- 65 - R.F.M. SUREAU , BSCF , 622 ,(1956)
- 66 - R.A. ROBINSON , NBS , 68 A , n° 2 , 159 ,(1964)
- 67 - R.A. ROBINSON , NBS , 71 A , n° 3 , 213 ,(1967)
- 68 - A. FISCHER - G.J. SUTHERLAND - R.D. TOPDOM - J. VAUGHAN , JCS, 5948 , (1965)
- 69 - A. BRYSON - R.W. MATTHEWS , AJC , 401 , 16 ,(1963)
- 70 - I. MENTRE - R. GABORIAUD - R. SCHAAL , CRAS , 269 C , 1583 ,(1969)
- 71 - I. MENTRE - R. GABORIAUD - G. HUI BON HOA , CRAS , 268 C , 2332 ,(1969)
- 72 - G. HUI BON HOA - P. DOUZOU - A.M. MICHELSON , Biochim. biophys. Acta , 102 , 334 ,(1969)
- 73 - E. GRUNWALD - B.J. BERKOWITZ , JACS ,(1951), 73 , 4939
- 74 - G. HUI BON HOA - R. GABORIAUD - P. DOUZOU , CRAS , 270 C , 373 ,(1970)
- 75 - C.L. DE LIGNY - P.F.M. LUYCKX - A.A. WIENECKE , Rec. Trav. Chim. Pays-Bas (1960), 79 , 699 et 713
- 76 - id (1960),79 , 713
- 77 - G. CHARLOT - B. TREMILLON , Les réactions chimiques dans les solvants et les sels fondus , Gauthier-Villars, Paris ,(1963)
- 78 - R. GABORIAUD , Thèse Paris (1967) , n° CNRS : AO-1408 voir aussi (89)
- 79 - I.M. KOLTHOFF - S. BRUCKENSTEIN , Treatise on analytical chemistry , Interscience Encyclopedia INC. , 1 , 475, New York(1959)
- 80 - R. GABORIAUD - R. SCHAAL , JCP, 66 , n° 4 , 730 ,(1969)
- 81 - R. GABORIAUD , CRAS , 263 C , 911 ,(1969)
- 82 - E.E. SAGER - R.A ROBINSON - R.G. BATES , NBS , A 68 , 305 ,(1964)
- 83 - M. WOODHEAD - M. PAABO - R.A. ROBINSON - R.G. BATES ,NBS , A 69 , 263,(1965)
- 84 - M. PAABO - R.G. BATES - R.A. ROBINSON , JPC , 70 , 247 ,(1966)
- 85 - J. JUILLARD , BSCF ,(1964), 3069
- 86 - B.J. THAMER - A.F. VOIGT ,JPC , 56 , 225 , (1952)
- 87 - KOK PENG ANG , JPC , 62 , 110ç ,(1958)
- 88 - MARCHLEWSKI - MAYER , Bull.Intern.acad.Pol., n° 3 A , 169 (1929)
voir aussi : CA , 24 , 2052 ,(1930)
- 89 - R. GABORIAUD , ANN ,(1967),201

- 90 - J. AURIACOMBE - J.P. MOREL , CRAS , (1968), 267 , 377
- 91 - K. LAUER , BER , 70 B , 1288 , (1937)
- 92 - DIPPY - HUGHES - LAXTON , JCS , 1470 , (1954)
- 93 - BETHMANN , ZPC , 5 , 385 , (1890)
- 94 - A. BRYSON , TFS , 45 , 257 , (1949)
- 95 - J.M. LOS - R.F. REKKER - C.H.T. TONSBEEK , Rec.Trav.chim. Pays Bas
86 , 60 , (1967)
- 96 - A. BRYSON , TFS , 47 , 522 , (1951)
- 97 - J. JUILLARD , BSCF , 1883 , (1968)
- 98 - J. JUILLARD , Thèse Clermont-Ferrand (1968) série E-86
- 99 - KILPATRICK - ARENBERG , JACS , 75 , 3812 , (1953)
- 100 - A.V. WILLI - W. MAYER , HCA , 39 , 318 , (1956)
- 101 - BRYSON - DAVIES , JACS , 85 , 1933 , (1963)
- 102 - BRYSON - DAVIES , Nature , 195 , 996 , (1962)
- 103 - H.H. JAFFE , Chem. Rev., 53 , 191 , (1953)
- 104 - R. GABORIAUD - I. MENTRE - R. SCHAAL , CRAS , 268 C , 1093 , (1969)
- 105 - R. GABORIAUD , JCP , 66 , n° 1 , 10 , (1969)
- 106 - D.D. PERRIN , AJC , 17 , 484 , (1964)
- 107 - M.P. DEBEY , Thèse III° cycle , Paris janvier 1970
- 108 - M. HOJO - K. KATSURAKAWA - Z. YOSHIDA , T. Letters , n° 12 , 1497 , (1968)
- 109 - A. STREITWIESER Jr. - R.W. TAFT , Progress in Physical Organic Chemistry
J. Wiley Ed., New York (1968) volume VI
- 110 - H.H. STROH - G. WESTPHAL , BER , 96 , 184 , (1963)
- 111 - J. JUILLARD , BSCF , 5 , 1727 , (1966)
- 112 - J. JUILLARD - N. SIMONET , BSCF , n° 5 , 1883 , (1968)
- 113 - C. MOREAU , BSCF , 31 , (1968)
- 114 - F. TERRIER - F. MILLOT - R. SCHAAL , BSCF , n° 9 , 3002 , (1969)
- 115 - F. TERRIER , ANN , n° 4 , 153 , (1969)
- 116 - R. THUAIRE , BSCF , n° 12 , 3944 , (1966)
- 117 - R. THUAIRE , CRAS , 267 C , 993 , (1968)
- 118 - J. LELIEVRE - R. GABORIAUD - R. SCHAAL , JCP , 67 , n° 5 , 917 , (1970)
- 119 - P.O. LUMME , Suomen Kemist. , 30 B , 176 , (1957)
- 120 - D. PELTIER - M. CONTI , CRAS , 244 , 2811 , (1957)
- 121 - A.M. LIQUORI - A. RIPAMONTI , Gazz.chim.Ital. , 85 , 578 , (1955)
- 122 - S. KILPI - P. HARJANNE , Suomen Kemist. , 21 B , 14 , (1948)
- 123 - K. WINKELBLECH , ZPC , 36 , 564 , (1901)
- 124 - B. HOLMBERG , ZPC , 62 , 708 , (1907)
- 125 - H. LUNDEN , ZPC , 62 , 708 , (1907)
- 126 - G. SCHWARZENBACH - A. WILLI - R.O. BACH , HCA , 30 , 1303 , (1947)

- 127 - C.C. CLEAR - G.E.K. BRANCH , JOC , 2 , 522 ,(1938)
- 128 - I.M. HEILBRON - H.M. BUNBURY , Dictionary of organic compounds
Eyre - Spottiswood Ed., London (1943)
- 129 - D.J.G. IVES - P.D.P. MARSDEN , JCS , 649 ,(1965)
- 130 - A. ALBERT - G. GOLDACRE , Nature , 149 , 245 ,(1942)
- 131 - A.C. CUMMING , ZPC , 57 , 574 ,(1907)
- 132 - H. SVENSON , Acta chem. Scand., 16 , 456 ,(1962)
- 133 - K. MYRBAEK , Phys. Chem., 158 , 261 ,(1926)
- 134 - F.L. HAHN - R. KLOCKMANN , ZPC , 157 , 212 ,(1931)
- 135 - BADER , ZPC , 6 , 289 ,(1890)
- 136 - A.A. BOTHNER BY - A.I. MEDALIA , JACS , 74 , 4402 ,(1952)
- 137 - G.E.K. BRANCH - D.L. YOHROFF , JACS , 56 , 2568 ,(1934)
- 138 - G.W.K. CAVILL - N.A. GIBSON - R.S. NYHOLM , JCS , 2466 ,(1949)
- 139 - B. GUTBEZAHN - E. GRUNWALD , JACS , 75 , 559 ,(1953)
- 140 - B.S. SMOLYAKOV , CA , 66 , 32397 p
- 141 - J.F.J. DIPPY , Chem. Revs., 25 , 151 ,(1939)
- 142 - A.V. WILLI - J.F. STOKER , HCA , 38 , n° 5 , 1279 ,(1955)
- 143 - I.D. TABAGUA , Russ. J. of Pys. Chem., 7 , 37 ,(1963)
- 144 - E. GRUNWALD - B.J. BERKOWITZ , JACS , 73 , 4939 ,(1951)
- 145 - V.A. KOPTYUG - A.N. BEREZINA - V.P. PETROV , CA , 66 , 85366 j
et 66 , 65308 p
- 146 - PRICE - MERTZ - WILSON , JACS , 76 , 5131 ,(1954)
- 147 - S. OAE - C.C. PRICE , JACS , 79 , 2547 ,(1957)
- 148 - E. BERLINER - E.H. WINICOV , JACS , 81 , 1630 ,(1959)
- 149 - R.C. FARMER - F.I. WARTH , JCS , 85 , 1713 ,(1904)
- 150 - J.D. ROBERTS - R.L. WEBB , JACS , 72 , 408 ,(1950)
- 151 - M. GILLOIS - P. RUMPF , BSCF , 112 ,(1954)
- 152 - R.N. BEALE , JCS , 4494 ,(1954)
- 153 - K. PEDERSEN , Kja. Danske Videnske Selskab , 14 , 9 ,(1937)
- 154 - A.L. BACARELLA - E. GRUNWALD , JOC , 20 , 747 ,(1955)
- 155 - J.C. JAMES - J.G. KNOX , TFS , 46 , 257 ,(1950)
- 156 - M.M. FICKLING - A. FISCHER - B.R. MANN - J. PACKER - J. VAUGHAN ,
JACS , 81 , 4226 ,(1959)
- 157 - L.A. FLEXER - L.P. HAMMETT - A. DINGWALL , JACS , 57 , 2103 ,(1935)
- 158 - D.D. PERRIN , Dissociation Constants of organic bases in aqueous
solutions , Butterworths , London (1965)
- 159 - F. TERRIER , ANN , 4 , 153 ,(1969)
- 160 - A.L. BACARELLA - E. GRUNWALL - H.P. MARSHALL - E. LEE PURLEE ,
JOC , 20 , 747 ,(1955)
- 161 - H.N. PARTON - J. ROGERS , TFS , 38 , 238 ,(1942)

- 162 - J.F. COETZEE - C.D. RITCHIE , Solute-Solvent interactions
Dekker Edit. , New York (1969)
J.W. LARSON - L.G. HEPLER : Heats and Entropies of ionization
R.G. BATES : Medium effects and pH in non aqueous solvents
- 163 - G.C. PIMENTEL - A.L. Mc CLELLAN , The Hydrogen Bond , Freeman Ed. (1960)
- 164 - V.A. KOPTYUG - V.P. PETROV , CA , 62 , (1965) , 7619 efg
- 165 - K. BOWDEN - D.C. PARKIN , CJC , 47 , 185 , (1969)
- 166 - G. THIROT , Revue Ingénieurs EPCI , (1965), 44 , 11 et 45 , 11
- 167 - G. THIROT , BSCF , 739 , (1967)
- 168 - R.W. TAFT , JPC , 64 , 1805 , (1960)
- 169 - V.A. KOPTYUG - V.P. PETROV - T.N. GERASIMOVA , CA , 62 , 7619 g (1965)
- 170 - L.P. HAMMETT , Physical organic chemistry , Mc Graw Hill ED. , (1940)
- 171 - M. HOJO - Z. YOSHIDA , Kagaku no Ryoiki , 19 , 350 , 435 , 514 , (1965)
- 172 - J. HERMANS - S.J. LEACH - H.A. SCHERAGA , JACS , 85 , 1390 , (1963)
- 173 - N. MORI - Y. ASANO - T. IRIE - Y. TSUZUKI , Bull.chem.Soc. Japon ,
42 , 482 , (1969)
- 174 - R. THUAIRE , BSCF , 67 , 1076 , (1970)
- 175 - P.R. WELLS , Chem. Rev. , 63 , 171 , (1963)
- 176 - P.R. WELLS , Linear Free Energy Relationships . Acad. Press , (1968)
- 177 - C.D. RITCHIE - E.S. LEWIS , JACS , 84 , 591 , (1962)
- 178 - J.D. ROBERTS - W.T. MORELAND , JACS , 75 , 2167 et 637 (1953)
- 179 - S. EHRENSON , Progress in physical organic chemistry , vol. 2 , 195
- 180 - G. THIROT , communication personnelle , à paraître
- 181 - A. TRAMER , JPC , 74 , 887 , (1970)
- 182 - A. TRAMER , JCP , 239 , (1970)
- 183 - A. TRAMER , J. Molecular Structure , 4 , 313 , (1969)

.....

- 200 - I. MENTRE , 2° sujet de thèse , LFER en système naphthalénique .

.....

BIBLIOGRAPHIE INFRA - ROUGE

- 501 - C. CAULLET - A. VIREY - J.C. GENDRE - C. KIRSCHÉ - J. VIREY , CRAS ,
264 C , 1800 , (1967)
- 502 - L.J. BELLAMY , The I.R. spectra of complex molecules , Methuen Ed.
London (1962)
- 503 - G. DUYCKAERTS , Analyst , 84 , 201 , (1959)
- 504 - I. GANGULY - C.I. JOSE - A.B. BISWAS , SPA , 24 A , 215 , (1968)

- 505 - I. GOPAL - C.I. JOSE - A.B. BISWAS , SPA , 23 A , 513 , (1967)
- 506 - L.V. BLARICOM - E.C. GILBERT , JACS , 61 , 3238 , (1939)
- 507 - D. PELTIER - M.L. JOSIEN , CRAS , 248 , 1148 , (1959)
- 508 - R. KUHN - W. OTTING - K. GEIDER , BER , 101 , 3597 , (1968)
- 509 - J. BELLANATO , Anal. Soc. Esp. fis. quim., 62 , (A), 1 , (1966)
- 510 - J. BELLANATO , Opt. pur. appl. , 1 (30) , (1968) , 73
- 511 - J. BELLANATO , Opt. pur. appl. , 1 (2) , (1968) , 85
- 512 - I. MENTRE , rapport 1967 INSCI Rouen , non publié
- 513 - A. GROULT , mémoire Ingénieur CNAM , Rouen 1968 , non publié
- 514 - BRIGODIOT - LEBAS , JCP , 62 , 347 , (1965)
- 515 - D.B. SCULLY - D.H. WIFFEN , SPA , 16 , 1409 , (1960)
- 516 - D.E. FREEMANN - I.G. ROSS , SPA , 16 , 1393 , (1960)
- 517 - E.R. LIPPINCOTT - E.J. O'REILLY , JCP , 23 n° 2 , 238 , (1965)
- 518 - H. LUTHER - G. BRANDES et coll. , ZE , 59 , 1012 , (1955)
- 519 - W. BRUHN - R. MECKE , ZE , 62 , 441 , (1958)
- 520 - G.C. PIMENTEL , JCP , 19 , 1535 , (1951)
- 521 - D.B. SCULLY - D.H. WIFFEN , J. Mol. Spektr. , 1 , 257 , (1957)
- 522 - E.W. SCHMIDT , ZE , 62 , 1005 , (1958)
- 523 - W.B. PERSON - G.C. PIMENTEL - O. SCHNEPP , JCP , 23 , 230 , (1955)
- 524 - H. LUTHER - K. FELDMANN - B. HAMPEL , ZE , 59 , 1018 , (1955)
- 525 - W.B. PERSON - G.C. PIMENTEL , JCP , 20 , 1913 , (1952)
- 526 - S.S. MITRA - H.J. BERNSTEIN , CJC , 37 , 553 , (1959)
- 527 - G.C. PIMENTEL - A.L. Mc CLELLAN , JCP , 20 , 270 , (1957)
- 528 - A. CLAUSTRE - J.C. GENDRE - C. KIRSCH - J. VIREY , } rapport non publié
- 529 - J.P. DHAINAUT - J. MAYER - J.C. PAYAN , } INSCI Rouen
- 530 - H. LUTHER - J. DREWITZ , ZE , 66 , 546 , (1962)
- 531 - N. CLAVERIE - C. GARRIGOU LAGRANGE , JCP , 61 , 889 , (1964)
- 532 - N. LECALVE CLAVERIE , ANN , 10 , 5 , (1965)
- 533 - M. St FLETT , Characteristic frequencies of chemical groups in the
I.R., Elsevier , (1963)
- 534 - J. LECOMTE , Handbuch der Physik , tome 26 , 244 à 937 , Springer Verlag
(1958)
- 535 - M.M. DAVIES - G.B.B.M. SUTHERLAND , JCP , 6 , 755 , (1938)
- 536 - A.M. BUSWELL - W.H. RODEBUSH - M.F. ROY , JACS , 60 , 2239 , (1938)
- 537 - S. BRATOZ - D. HAZI - N. SHEPPARD , SPA , 8 , 249 , (1956)
- 538 - M. TSUBOI - T. TAKENISHI - A. NAKAMURA , SPA , 19 , 271 , (1963)
- 539 - J. VIREY , Thèse Docteur Ingénieur , Rouen 1969 ,
- 540 - A.I.M. RAE - E.N. MASLEN , Acta crystallog., 18 , 301 , (1965)
- 541 - S.R. HALL - E.N. MASLEN , Acta crystallog., 15 , 1285 , (1962)
- 542 - S.R. HALL - E.N. MASLEN , Acta crystallog., 22 , 216 , (1967)

- 543 - A.D. CROSS , Introduction to practical I.R. spectroscopy , Butterworths
2° Edition , London , (1964)
- 544 - P.J. KRUEGER - H.W. THOMPSON , Proc. Roy. Soc. (1959) , A 250 , 22
- 545 - J. MAYER , Thèse Docteur Ingénieur , Rouen 1969
- 546 - J.G. HAWKINS - E.R. WARD ; D.H. WIFFEN , SPA , 10 , 105 , (1957)
- 547 - N. CLAVERIE - P. DIZABO - C. GARRIGOU LAGRANGE - M.L. JOSIEN ,
JCP , 60 , 746 , (1963)
- 548 - R.L. WERNER - W. KENNARD - D. RAYSON , AJC , 8 , 346 , (1955)
- 549 - I. MENTRE , rapport DEA chimie organique Rouen 1968 , non publié
- 550 - C. CAULLET - J. MAYER - I. MENTRE - J. VIREY , CRAS , 268 B , 1237 ,
(1969)
- 551 - L.J. BELLAMY , JCS , 2818 , (1955)
- 552 - OKAZAKI - ISHIKAWA , CA , 51 , 8050 , (1957)


ABREVIATIONS :

L.F.E.R = Relation linéaire d'enthalpie libre
 I.R = Infra - Rouge
 U.V. = Ultra - Violet

NOMENCLATURE :

NAPHTALENE :

positions 1,4,5,8 ... sommets α
 positions 2,3,6,7 ... sommets β
 substitution 1-2 ou 1-3 .. ortho
 substitution 1-8 péri



X = substituant
 Y = centre réactif
 Y = substrat organique

AH = acide ou groupe fonctionnel d'ionisation $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$
 B = base ou groupe fonctionnel d'ionisation $H^+ + B \rightleftharpoons BH^+$
 I^+ = ion $^+H_3N-T-COOH$ I^- = ion $H_2N-T-COO^-$
 M = molécule $H_2N-T-COOH$ Z = zwitterion $^+H_3N-T-COO^-$

SYMBOLES :

ν = fréquence (en cm^{-1} , I.R)
 λ = longueur d'onde (en nm, U.V)
 θ = température (en $^{\circ}C$,)
 d = densité optique
 ϵ = coefficient d'absorption molaire
 c = concentration
 t = teneur en zwitterions dans le mélange
 ν = vibration de valence (IR)
 γ = vibration hors du plan ("bending" IR)
 ρ = vibration "rocking" (IR)
 ω = vibration "wagging" (IR)
 δ = vibration de déformation de liaison (IR)

(i) = activité du constituant i
 $[i]$ = concentration " " "
 γ_i = coefficient d'activité de la particule i dans s

$$r = \frac{[BASE]}{[ACIDE]}$$

$$pK^* = pH - \log r$$

$$pK' = -\log [H^+] - \log r$$

ΔH = enthalpie de réaction
 ΔS = entropie de réaction
 ΔG = enthalpie libre " "

SE = F.E.M dans le solvant S

$${}_o\Delta_i pK = pK_o - pK_i$$

$${}_S\Delta^E pK = p^S_K - p^E_K$$

${}_S K_i$ = constante de dissociation relative à l'équilibre i dans S

MATERIEL et TECHNIQUES

DOMAINE INFRA-ROUGE :

Les spectres infra-rouge ont été enregistrés à l'aide d'un spectrophotomètre LEITZ-111-G, avec l'air pour référence. Le domaine étudié s'étend de 550 à 4000 cm^{-1} . La précision des mesures varie de 10 cm^{-1} à 3000 cm^{-1} , à 2 cm^{-1} vers 600 cm^{-1} .

La détermination plus précise des nombres d'onde des bandes d'absorption, et leurs déplacements sous l'influence des substituants, a été réalisée grâce à un spectrophotomètre BECKMANN de type IR-11 (avec monochromateur IR-12 à réseau). L'étalonnage dans la zone de fréquence utilisée est réalisé avec un film de polystyrène. La vitesse de défilement choisie ($0,9\text{ cm}^{-1}$ par minute à 900 cm^{-1} et 18 cm^{-1} par minute à 3200 cm^{-1}) permet d'obtenir une incertitude expérimentale inférieure à 1 cm^{-1} dans le premier cas, et inférieure à 2 cm^{-1} dans le second.

Tous les échantillons ont été étudiés sous forme de dispersion fine de 2 à 3 mg de produit sec solide, dans une pastille vitrifiée de 1 g de bromure de potassium anhydre.



DOMAINE ULTRA-VIOLET :


Les spectres UV, en solutions aqueuses ou hydrométhanoliques, à 20°C ont été enregistrés à l'aide des spectrophotomètres BECKMANN DK-11-B, DB, DB-G. Certains spectres, plus précis, ont été tracés point par point avec les mesures effectuées sur BECKMANN DU-11.

Ces appareils ont été utilisés avec des cellules fermées de 1 cm d'épaisseur, en quartz, en ambiance thermostatée à 20°C .

Les spectres UV obtenus à basse température, ont été tracés grâce à un spectrophotomètre CARY 15 muni d'une chambre transparente, spéciale pour le refroidissement des solutions par passage d'azote gazeux froid. Cet appareil a été mis à notre disposition par M. DOUZOU et ses chercheurs travaillant dans l'équipe de M. PULMANN à l'Institut de Biologie Physico-Chimique (voir les références 71 à 74, 107).

table de corrélation des absorptions I.R. des dérivés naphtaléniques





PREPARATION DES PRODUITS

I -ORIGINE DES PRODUITS ETUDIES :

Les acides amino- et hydroxy- benzoïques sont des produits du commerce .

Les acides hydroxy-2 naphtoïques-1 , hydroxy-1 et -3 naphtoïques -2 nous ont été fournis par les Ets BAYER A.G. , ce dernier nous a été également fournis par les sociétés FMC,SA et SANDOZ .


L'acide amino-3 naphtoïque-2 nous a été fournis par la FMC.S.A.

Les acides hydroxy-5,-6,-7,-8 naphtoïque-1
hydroxy-5,-6,-7,-8 naphtoïque-2
amino -3,-4,-5,-6,-8 naphtoïque-1
amino -1,-3,-4 naphtoïque -2
ont été préparés spécialement pour cette étude .




II - BIBLIOGRAPHIE DES PREPARATIONS :

- 401 - F.A. ROYLE - J.A. SCHEDLER ,J.Chem.Soc.,(1923) ,1641
C. BUTLER - F.A. ROYLE ,J.CHEM.Soc.,(1923) , 1649
- 402 - H.A. HARRISON - F.A. ROYLE ,J.Chem.Soc.,(1926), 84
GOLDSTEIN - FISCHER ,Helv.Chim.Acta ,(1938),21, 1519
- 403 - I.G. FARBEN ,brevets DRP.622308 (1934) Chem.Abs.,30, (P) 1391
- 404 - A. GROULT ,mémoire Ingénieur CNAM Rouen 1968 non publié
- 405 - FIERZ-DAVID - MANNHARDT ,Helv.Chim.Acta ,20, (1937) , 1024
- 406 - LESSER , A. 402 ,(1914) , 31
- 407 - B.E. CROSS - H.D.K. DREW ,J.Chem.Soc.,?(1949) 1532
- 408 - W.F. BEECH - N. LEGG , J.Chem.Soc.,(1950),961
- 409 - H.H. HODGSON - J. WALKER ,J.Chem.Soc.,(1933), 1620
- 410 - BRADBROOK - LINSTED , J.Chem.Soc.,(1936),1739
- 411 - GRAEBE - BRIONES,A. 327 ,(1903),77
- 412 - G.J. LEUCK -R.P. PERKINS -F.C. WHITMORE ,J.Amer.Chem.Soc.,(1929),51,1834
- 413 - GRAEBE - GFELLER ,Ber.,25, (1892),652
- 414 - FRIEDLAENDER - WEISBERG , Ber.,28, (1895),1842
- 415 - A.G. ECKSTRAND , J.Pr.,(2),38,244
- 416 - OKAZAKI -ISHIKAWA ,Chem.Abs.,51, (1957),8050 - 8051
- 417 - A.G. ECKSTRAND , J. Pr.,(2),38,180
- 418 - BRAMBERGER - PHILIP ,Ber.,20, 243
- 419 - FRIEDLAENDER - WOROSHZOW , A.,388, 20
- 420 - ANSELM - ZUCKMAYER , Ber.,32, (1899),3283
- 421 - KATO - HASHIMOTO , Chem. Abs.,51, (1957),8051
- 422 - I.MENTRE , rapport 4° année ,INSCI Rouen ,(1967), non publié






1° - PREPARATION DES DERIVES HYDROXYLES (ref.401) :




2° - PREPARATIONS DES DERIVES AMINES :

410
422

404

404
409404
407
422404
408404
407



PREPARATION DES SOLUTIONS

I - METHANOL :

Le méthanol utilisé est du méthanol " pur commercial " purifié par distillation fractionnée , après reflux , pendant plusieurs heures sur calcium (159) .

II - SOLVANTS MIXTES :

Les solutions mixtes sont préparées par mélange d'eau et de méthanol . Elles ont été obtenues de la façon suivante :

dans une fiole jaugée de 10 ml			
symbole du solvant mixte	volume de MeOH ml	volume d'eau ml	% en masse de MeOH à 20°
E	0	qsp 10 ml	0
S 1	1	"	8,2
S 2	2	"	16,4
S 3	3	"	25,0
S 4	4	"	34,1
S 5	5	"	43,2
S 6	6	"	53,0
S 7	7	"	63,6
S 8	8	"	74,6
S 9	qsp 10 ml	1	87,7
S 9,5	"	0,5	93,9

III - PREPARATION D'UNE SOLUTION TAMPON ACETIQUE :

Une solution aqueuse d'acide acétique 2 M a été réalisée par pesée . A partir de cette solution mère , on a obtenu des mélanges tampons en solution aqueuse de pH variés , par addition de soude et d'acide chlorhydrique (Tableau C-1) . Ces solutions , de force ionique 0,1 M ont permis de réaliser des solutions tamponnées à une force ionique de 0,01 M en milieu mixte .

Ainsi , le tampon A₀ en milieu S₅ correspond à :

$$\begin{cases} 1 \text{ ml de solution stock A}_0 & \mu = 0,1 \text{ M} \\ 5 \text{ ml de méthanol anhydre} \\ \text{eau} & \text{qsp 10 ml} \end{cases}$$

IV - TAMPONS UTILISES EN REFERENCE :

Les tampons utilisés comme références sont ceux tirés des travaux de GABORIAUD (81) : acétate , mandélate , collidinium , pyridinium , et des travaux de DE LIGNY (75,76) : Oxalate I et succinate .

Tableau A

acide	milieu	Spectrophotométrie en milieu tamponné	Potentiométrie		moyenne	pK $\mu = 0$	λ nm
			0,01 M $\mu =$	0,002 M $\mu =$			
NA-1	Eau	3,68 3,69 3,70			3,68	3,72	310
	S 1	3,82 3,85 3,88			3,85	3,90	
	S 2	4,07 4,06			4,07	4,12	
	S 3	4,26 4,27			4,27	4,32	
	S 4	4,56 4,51		4,58	4,54	4,60	
	S 5	4,78 4,77	4,78	4,80	4,77	4,83	
	S 6	5,04 5,03	5,04	5,08	5,03	5,10	
	S 7	5,32 5,30	5,33	5,34	5,32	5,40	
	S 8	5,67 5,61	5,66	5,70	5,64	5,74	
	S 9	6,44 6,37	6,44	6,48	6,42	6,53	
	S 9,5	6,91 6,95	6,95	6,98	6,94	7,07	
NA-2	Eau	4,13 4,13 4,15 4,12			4,13	4,16	$\lambda_1 =$ 322 $\lambda_2 =$ 336
	S 1	4,38 4,36 4,32 4,34			4,35	4,40	
	S 2	4,46 4,47 4,46 4,48			4,47	4,52	
	S 3	4,70 4,65 4,69 4,66			4,68	4,73	
	S 4	4,96 4,94 4,96 4,95		4,98	4,96	5,02	
	S 5	5,17 5,16 5,15 5,12	5,12	5,14	5,15	5,21	
	S 6	5,36 5,34 5,35 5,33	5,35	5,40	5,35	5,42	
	S 7	5,61 5,62 5,58 5,60	5,64	5,66	5,61	5,69	
	S 8	6,02 6,02 5,98 6,00	6,02	6,05	6,00	6,09	
	S 9	6,78 6,76 6,79 6,78	6,78	6,81	6,77	6,88	
	S 9,5	7,30 7,27 7,35 7,31	7,33	7,36	7,31	7,44	
NB-1	Eau	4,03 4,04			4,03	3,99	310
	S 1	4,06 3,98			4,02	3,97	
	S 2	3,96 3,98			3,97	3,92	
	S 3	3,88			3,88	3,83	
	S 4	3,82		3,80	3,82	3,76	
	S 5	3,80	3,80	3,74	3,80	3,74	
	S 6	3,69 3,67	3,67	3,64	3,68	3,61	
	S 7	3,68 3,62	3,64	3,60	3,64	3,56	
	S 8	3,69 3,60	3,68	3,62	3,66	3,57	
	S 9	3,83 3,83	3,85	3,78	3,83	3,72	
	S 9,5	4,08 4,05	4,04	4,00	4,06	3,93	
NB-2	Eau	4,19 4,20 4,22			4,20	4,16	340
	S 1	4,23 4,21			4,21	4,16	
	S 2	4,15 4,11			4,12	4,07	
	S 3	4,07 4,04			4,06	4,01	
	S 4	3,97		3,95	3,97	3,91	
	S 5	3,88 3,83	3,86	3,83	3,86	3,80	
	S 6	3,74 3,86 3,82	3,78	3,75	3,80	3,73	
	S 7	3,83 3,77	3,76	3,73	3,78	3,70	
	S 8	3,79 3,79	3,78	3,74	3,78	3,69	
	S 9	4,03 3,98	3,96	3,96	3,98	3,87	
	S 9,5	4,14 4,15	4,15	4,16	4,15	4,05	

NA-1 : pK de l'acide naphtoïque-1

NA-2 : pK de l'acide naphtoïque-2

NB-1 : pK de l'ion naphtylamonium-1

NB-2 : pK de l'ion naphtylamonium-2

Tableau B

techn.que	constantes	méthode	conditions d'étude	Eau	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9
MESURES SPECTROPHOTOMETRIQUES	DETERMINATION DE pK_I'		$\alpha = \beta$	nm nm nm n	287 324 284 318 2	280 316 278 314 2							
			itéra- tions	nm nm n i	287 324 284 318 2	280 316 278 314 2		277 312 2					
			acidi- tés sépar.	nm nm n									
				nm 1000.D 1000.Dm 1000.D	300,0 28 802 609 552	302,2 28 798 584 513	302,5 28 793 554 475	302,7 28 790 534 454	303,0 28 786 526 460	303,3 28 784 506 448	303,5 28 784 470 436	303,8 784	304,4 784
			extra.									300 370 4	300 370 5
			acidi- tés sépar.	nm nm n								300 370 12	300 370 14
			itéra- tions	nm nm n i	287 324 284 318 2	280 316 278 314 2		277 312 2					
			$\alpha = \beta$	nm nm nm n	287 324 284 318 2	280 316 278 314 2							
MESURES POTENTIOMETRIQUES	pK_I'		1000.Co n i		287 324 284 318 2	280 316 278 314 2							
	pK_{II}'		1000.Co n i		287 324 284 318 2	280 316 278 314 2							

n = nombre de mesures - i = nombre d'itérations - extra. = méthode d'extrapolation
 $D_m = D_{minimum}$

p^H des tampons pour des teneurs variables en méthanol

milieu tampons	So = E	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Oxalique	2,15	2,18	2,22	2,27	2,33	2,40	2,50	2,63	2,91	3,57
Mandélique	3,45	3,62	3,77	3,94	4,14	4,33	4,56	4,84	5,15	5,91
Succinique	4,12	4,27	4,42	4,58	4,76	4,93	5,12	5,38	5,75	6,53
Acétique	4,75	4,86	4,97	5,09	5,25	5,45	5,66	5,94	6,27	7,04
Collidine	7,30	7,21	7,10	6,95	6,75	6,50	6,27	6,01	5,91	6,01
Pyridine	5,23	5,18	5,03	4,86	4,68	4,49	4,29	4,08	3,93	3,96
C4	2,38	2,47	2,56	2,66	2,77	2,87	3,00	3,21	3,54	4,34
C3	2,45	2,57	2,67	2,80	2,94	3,05	3,22	3,45	3,84	4,68
C2	2,56	2,68	2,82	2,95	3,10	3,24	3,40	3,65	4,07	4,90
C	2,68	2,82	2,95	3,10	3,26	3,41	3,58	3,86	4,25	5,11
C	2,84	2,98	3,12	3,28	3,44	3,60	3,75	4,00	4,40	5,27
L 4	2,80	2,96	3,10	3,25	3,42	3,57	3,76	4,00	4,42	5,22
L 3,5	3,00	3,15	3,29	3,45	3,62	3,77	3,95	4,22	4,63	5,40
L 3	3,12	3,27	3,43	3,60	3,76	3,91	4,12	4,39	4,80	5,59
L 2,5	3,29	3,45	3,61	3,78	3,96	4,13	4,30	4,57	4,98	5,78
L 2	3,40	3,75	3,73	3,90	4,09	4,28	4,44	4,72	5,12	5,95
L 1,5	3,59	3,89	3,91	4,08	4,26	4,45	4,61	4,88	5,26	6,06
L 1	75	4,02	4,05	4,22	4,40	4,57	4,74	5,00	5,40	6,20
L 0,5	3,85	4,18	4,18	4,35	4,52	4,70	4,89	5,15	5,51	6,33
L 0	4,03	4,18	4,33	4,49	4,67	4,81	5,00	5,27	5,60	6,47
A 4	3,65	3,81	3,97	4,13	4,31	4,50	4,65	4,93	5,31	6,09
A 3,5	3,85	4,02	4,18	4,35	4,52	4,70	4,88	5,16	5,50	6,29
A 3	4,12	4,27	4,40	4,54	4,70	4,86	5,01	5,29	5,67	6,43
A 2,5	4,28	4,42	4,55	4,68	4,83	4,97	5,13	5,41	5,79	6,53
A 2	4,38	4,53	4,65	4,80	4,92	5,07	5,23	5,51	5,89	6,65
A 1,5	4,47	4,61	4,73	4,86	5,01	5,18	5,35	5,62	5,98	6,78
A 1	4,55	4,68	4,80	4,94	5,10	5,27	5,45	5,70	6,05	6,86
A 0,5	4,63	4,76	4,90	5,02	5,19	5,37	5,55	5,81	6,14	6,93
A 0	4,75	4,86	4,97	5,09	5,25	5,45	5,66	5,94	6,27	7,04

Tableau C

Tableau D
valeurs de pK à force ionique nulle , à 25°c
données de la littérature

solvant	acides carboxyliques			ref.	solvant	ions amoniuns			ref.
	B	N 1	N 2			A	N 1	N 2	
eau	4,20	3,70	4,16	61	eau		3,94	4,20	68
		3,69	4,17	91		4,59	3,92	4,16	7
		3,69	4,12	92		4,58	3,92	4,11	60
		3,69	4,17	93			3,92	4,27	149
	4,20	3,64		37		4,63			139
			4,28	135		4,51			64
		4,30		136		4,57			150
		4,18		137		4,58			151
		4,21		138		4,58			152
		4,19		139		4,59			153
		4,16		51		4,63			154
		4,20		140		4,63			155
		4,20		141		4,63			156
		3,99		142		4,64			157
						4,58	3,92	4,11	91
						4,58			65
							3,92	4,16	158
							4,76		126
Solvants hydro-organiques :									
E+OH	10,14			143					
100 %	10,25			144					
	10,22			116					
E+OH	5,57	5,47	5,66	12					
v/v	5,74	5,54		16					
		5,54	5,63	145					
E+OH	6,37	6,13		146					
78,1 %	6,70	6,25	6,30	147					
E+OH	5,83			17					
55 %									
BCS	5,89	5,89	5,95	148					
v/v									
acide benzoïque en milieu mixte					ion anilinium en milieu mixte				
auteurs				ref.	auteurs				ref.
eau-éthanol	{ JUIILLARD			98	eau-méthanol	BACARELLA...			160
	{ THUAIRE			117					
	{ GRUNWALD...			73					
eau-acétone	AURIACOMBE-MOREL			90					
eau-DMSO	AURIACOMBE-MOREL			90					
eau-méthanol	{ BACARELLA...			160					
	{ PARTON-ROGERS			73					
	{ TABAGUA			143					
	{ JUIILLARD			98					
					B = acide benzoïque				
					A = ion anilinium				
					N 1 = naphtalène substitué en -1				
					N 2 = naphtalène substitué en -2				
					BCS = butylcellosolve				
					DMSO= diméthylsulfoxyde				
					E+OH= éthanol				

Tableau E

pK apparents des acides amino benzoïques en solution aqueuse à 25° et $\mu=0$
données de la littérature

acide ortho amino benzoïque		acide méta amino benzoïque		acide para amino benzoïque		auteurs	ref.
pK _I	pK _{II}	pK _I	pK _{II}	pK _I	pK _{II}		
2,17	4,85	3,01	4,60	2,40	4,82	LEGGATTE - DUNN	35
2,12	4,90	3,07	4,78	2,42	4,83	VANDENBELT	51
2,09	4,97	3,12	4,74	2,41	4,85	CHRISTENSEN	29
2,11	4,95				4,90	LUMME	119
	4,77				4,86	PELTIER	120
2,14	4,80			2,29	4,89	LIQUORI	121
2,05	4,95	3,07	4,73	2,38	4,92	KILPI	122
2,14	4,98	3,09	4,79	2,37	4,94	WINKELBLECH	123
	4,97		4,78			HOLMBERG	124
	4,97					LUNDEN	125
			4,63			SCHWARZENBACH - WILLI	126
		3,08	4,77	4,87		BRYSON	6
		3,05	4,60			CLEAR - BRANCH	127
				4,92		HEILBRONN	128
				4,85		ROBINSON	4
2,05		2,90				STROH	110
						ALBERT	130
						KLOTZ - GRUEN	42
					4,92	JOHNSTON	62
2,07	4,98					CUMMING	131
1,76				2,16		MYRBAECK	133
2,00	4,82			2,19	4,64	HAHN	134
				2,37	4,68	KUMLER	10
2,04				2,32		SVENSON	132
1,89	4,87			2,20	4,68	SCHMIDT	43

UNIVERSITÉ DE PARIS

FACULTÉ DES SCIENCES
DE PARIS

9, QUAI SAINT BERNARD - PARIS V^e

SERVICE DE LA SCOLARITÉ

Bureau des Enseignements du 3^e Cycle

TÉLÉPHONE : 336-25-25 - P

PERMIS D'IMPRIMER

DOCTORAT : d'É.T.A.T.

THESE DE : ES-SCIENCES PHYSIQUES

Nom : MENTRE

Prénoms : Ivan, Guy

Né (e) le 23 AOÛT 1943 à LEVALLOIS-PER-Dép^t SEINE
RET.

SUJETS

1^{ère} THESE : " Tautomérie zwitterionique des acides amino
benzoïques et naphtoliques. "

2^e THESE (Propositions faites par la Faculté) :
" Relations d'enthalpie libre en systèmes Benzéniques et
Naphtaléniques. "

Vu et approuvé

Paris, le 30 MARS 1971.

Le Doyen de la Faculté
des Sciences de Paris

Vu et permis d'imprimer

Paris, le

Le Recteur de l'Académie
de Paris



